



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

フルコナゾール Fluconazole

フルコナゾール (CanesOral®、Diflucan®) は、カンジダ菌によるイースト感染症である外陰膣カンジダ症およびイースト菌龟头炎などの、特定の真菌皮膚感染症の治療に使われる経口の抗真菌薬です。

イースト感染症用クリームおよび／または膣錠による治療に関する情報は、別のハンドアウトをご覧ください：[イーストおよび真菌感染症](#)。

アレルギー (Allergies)

- フルコナゾール (CanesOral®、Diflucan®)、イトラコナゾール (Sporanox®)、ケトコナゾール、ポサコナゾール (Posanol®)、ボリコナゾール (Vfend®) などのアゾール系抗真菌薬にアレルギーがある場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。

妊娠および授乳 (Pregnancy and Breastfeeding)

- 妊娠中のフルコナゾールの使用は推奨されません。ご自身の医療提供者にご相談ください。
- フルコナゾールは、慎重に注意して授乳中に使用することができます。ご自身の医療提供者にご相談ください。

注意 (CAUTION)

- 薬物相互作用：**処方薬、市販薬、ハーブ系または嗜好用薬物を摂取している方は、ご自身の医療提供者に伝えてください。個々の薬物相互作用については、本文書には記載しません。
- メモ：**定期的に服用する処方量でフルコナゾールでの治療をすでに始めている場合は、この単回経口フルコナゾールでの治療は受けしないでください。

フルコナゾール (続き) Fluconazole (cont'd)

副作用 (Side Effects)

- 吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、頭痛または発疹が起こることがあります。
- 重度の皮膚反応が出た場合は、ご自身の医療提供者に直ちに連絡してください。

服用上の注意 (Instructions for Taking)

- 経口用錠剤またはカプセルを、水と一緒にまたは水なしで服用してください。
- フルコナゾール服用前に、薬の添付文書をよく読んでください。

保管上の注意 (Storage Instructions)

- 15～30°Cの室温で保存してください。
- 光、熱、湿度を避けてください。
- 記載された有効期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

特別な指示 (Special Instructions)

- 治療後も症状が継続する場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。
- 症状がない限り、性行為のパートナーに対する治療は必要ありません。

ご質問または詳しい情報をご希望の場合は、www.smartsexresource.com にアクセスするか、またはご自身の医療提供者にご連絡ください。