

# FOSFOMICINA (FOSFOMYCIN)

---

La fosfomicina es un antibiótico que se toma por vía oral para el tratamiento de infecciones simples de las vías urinarias, incluidas las infecciones de la vejiga.

## Alergias (Allergies)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alergia o sensibilidad a la fosfomicina trometamol o a cualquiera de los ingredientes de su fórmula, incluidos los saborizantes y los sulfitos.

## Embarazo y lactancia (Pregnancy and Breast/Chest Feeding)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene planes de quedar embarazada.
- La fosfomicina puede usarse con cautela durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su proveedor de atención médica.

## ADVERTENCIA (CAUTION)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna enfermedad hepática o renal.
- **Interacciones medicamentosas:** tenga en cuenta que este documento ya no incluye las interacciones medicamentosas individuales. Hable con su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo, o si ha recibido recientemente una vacuna de organismo vivo.

## Efectos secundarios (Side Effects)

- Podría presentar:
  - diarrea, dolor abdominal, indigestión, náusea y vómito
  - sarpullido y comezón
  - dolor de cabeza y mareo
  - escurrimiento nasal
  - dolor de espalda
- La diarrea se puede presentar 2 meses o más después de tomar su dosis. Informe a su proveedor de atención médica si su diarrea continúa o empeora.

## Instrucciones para su uso (Instructions for Taking)

- Siga las instrucciones de dosificación de su proveedor de atención médica.
- Tome la fosfomicina con el estómago vacío, o, por lo menos, 2 a 3 horas después de comer.
- Prepare la fosfomicina vaciando todo el polvo contenido en el paquete en 125 ml (1/2 taza) de agua fría. Mézclelo bien hasta que se disuelva y tómese de inmediato.
- No se tome el polvo seco directamente ni lo disuelva en agua caliente.

## Instrucciones de almacenaje (Storage Instructions)

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C. Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No abrir el paquete hasta que vaya a consumirse la dosis.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## Instrucciones especiales (Special Instructions)

- Si sus síntomas no han mejorado en 3 días o si están empeorando, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite <http://www.smartsexresource.com> o comuníquese con su proveedor de atención médica.