



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

ਲੈਵੋਨੋਰਜੈਸਟ੍ਰੋਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ (ਪਲੈਨ ਬੀ - Plan B[®] ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨੈਰਿਕ ਬਦਲ) **Levonorgestrel Emergency Contraception** (Plan B[®] or generic equivalent)

ਲੈਵੋਨੋਰਜੈਸਟ੍ਰੋਲ (ਪਲੈਨ ਬੀ - Plan B[®] ਜਾਂ ਜਨੈਰਿਕ ਬਦਲ) ਕੇਵਲ-ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਿਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੰਸੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ (ਗੋਲੀ) ਨੂੰ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ (120 ਘੰਟੇ) ਤਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੰਸੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸੰਭੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕੰਡੋਮ ਫਟ ਜਾਂ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਲੈਣਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀ, ਪੈਚ, ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ, ਡੈਪੋ-ਪ੍ਰੋਵੇਰਾ - Depo-Provera[®] ਦਾ ਟੀਕਾ), ਡਾਇਫਰਾਮ ਜਾਂ ਸਰਵੀਕਲ ਕੈਪ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ, ਫਰਟਿਲਟੀ ਭਾਵ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਲੱਗਣੀ (ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਟਾਈਲ ਦਿਨ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਲੈਣਾ), ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਵੀਰਜ ਛੁਟਣਾ, ਕਾਮੁਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ।

ਲੈਵੋਨੋਰਜੈਸਟ੍ਰੋਲ (ਪਲੈਨ ਬੀ - Plan B[®] ਜਾਂ ਜਨੈਰਿਕ ਬਦਲ) ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (How it Works)

- ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਨ ਲਈ ਲੈਵੋਨੋਰਜੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਿੰਜੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅੰਦਰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਐਲਰਜੀਆਂ (Allergies)

- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਵੋਨੋਰਜੈਸਟ੍ਰੋਲ ਜਾਂ ਇਸ ਗੋਲੀ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀ (CAUTION)

ਲੈਵੋਨੋਰਜੈਸਟ੍ਰੋਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ (ਚਲਦਾ) Levonorgestrel Emergency Contraception (cont'd)

- **ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ:** ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਹਰਬਲ, ਜਾਂ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
- **ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਵੋਨੋਰਜੈਸਟ੍ਰੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਬੌਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ” (ਬੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.) 25 kg/m² ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।** ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਨ ਦੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੈਵੋਨੋਰਜੈਸਟ੍ਰੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭਕਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਲੈਣਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਲੈਵੋਨੋਰਜੈਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲੈਵੋਨੋਰਜੈਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Side Effects)

- ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
- ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨੇਮੀ: ਪੀਰੀਅਡ (ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ) ਛੇਤੀ/ਦੇਰ ਨਾਲ/ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ: ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਦਸਤ ਲੱਗਣੇ।

ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (Instructions for Taking)

- ਕਾਮੂਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, 5 ਦਿਨਾਂ (120 ਘੰਟੇ) ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਲੈਵੋਨੋਰਜੈਸਟ੍ਰੋਲ 1.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਖੁਰਾਕ ਲਓ।
- ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੈਵੋਨੋਰਜੈਸਟ੍ਰੋਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ (ਚਲਦਾ) Levonorgestrel Emergency Contraception (cont'd)

ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (Storage Instructions)

- 15 ਅਤੇ 30°C ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
- ਰੋਸ਼ਨੀ, ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਨਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
- ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (Special Instructions)

- ਲੈਵੋਨੋਰਜੈਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਡੋਮ)। ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਵੋਨੋਰਜੈਸਟ੍ਰੋਲ “ਓਵਿਊਲੇਸ਼ਨ” (ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਐਮਰਜੰਸੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰੋ; ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਐਮਰਜੰਸੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਨੂੰ ਆਮ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਐਮਰਜੰਸੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਣ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਈ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
www.smartsexresource.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।