



BC Centre for Disease Control  
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services  
Provincial STI/HIV Clinic

Tel 604.707.5600  
Fax 604.707.5604

655 West 12th Avenue  
Vancouver, BC V5Z 4R4

www.bccdc.ca  
www.SmartSexResource.com

## メトロニダゾール Metronidazole

メトロニダゾールは、**細菌性膣炎 (BV)** またはトリコモナス症などの特定の性感染症 (STI) の治療のために経口で服用する抗生物質です。

### アレルギー (Allergies)

- **メトロニダゾール (Flagyl®)** にアレルギーがある場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。

### 妊娠および授乳 (Pregnancy and Breastfeeding)

- メトロニダゾールは、ご自身の医療提供者との相談のうえ、妊娠第一期（最初の3か月）に、また妊娠第二期および三期に使われることがあります。
- メトロニダゾールは、処方量によっては授乳中に使われることがあります。メトロニダゾールを単回投与で2グラム処方された場合、服用後12～24時間の母乳は、薬剤の混入を避けるため、搾乳後に廃棄してください。
- 未熟児または母体に肝臓または腎臓の問題がある場合は、ご自身の医療提供者に相談してください。

### 注意 (CAUTION)

- **薬物相互作用**：処方薬、市販薬、ハーブ系または嗜好用薬物を摂取している方は、ご自身の医療提供者に伝えてください。個々の薬物相互作用については、本文書には記載しません。
- 既往の心臓病または不整脈、および／または肝臓、血液、または神経疾患がある場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。
- **アルコールまたはアルコールを含む薬剤 (Nyquil®など)** は、服用の12時間前から服用までの間、治療中、および服用後24～48時間は服用しないでください。
- **メトロニダゾール服用中は、以下の薬剤を使用しないでください。**
  - **抗不整脈薬**：ドロネダロン (Multaq®)
  - **抗精神病薬**：ピモジド (Orap®)、ジプラシドン (Zeldox®)
  - **アルコール依存症治療薬**：ジスルフィラム (Antabuse®)
  - **HIV薬**：アンプレナビル (Agenerase®) 内用液、ロピナビル/リトナビル (Kaletra®) 内用液、リトナビル (Norvir®) 内用液、サキナビル (Invirase®)、チプラナビル (Aptivus®)
  - **寄生蠕虫治療薬**：メベンダゾール (Vermox®)
  - **経口腸チフスワクチン (Vivotif®)**

Last reviewed by BCCDC Pharmacy on April 2019

page 1 of 2

## メトロニダゾール (続き) Metronidazole (cont'd)

### 副作用 (Side Effects)

- 下痢、吐き気、腹痛、嘔吐、消化不良、口腔内の不快な金属味、尿の色が濃くなる、皮膚湿疹、掻痒、頭痛、めまい、または手足の脱力、しびれ、痛み、などの症状が起こるかもしれません。
- 発作、混乱、めまいのような神経疾患、または一時的な視覚障害があった場合は、ご自身の医療提供者に直ちに連絡し、運転や機械の操作は避けてください。
- アレルギーや皮膚反応のあった場合は、すぐにご自身の医療提供者に相談してください。

### 服用上の注意 (Instructions for Taking)

- メトロニダゾールは食物と一緒に服用することで胃もたれを軽減できます。
- 一回分を飲み忘れてしまった場合は、思い出した時にすぐその分を服用してください。ただし、次の服用時間がすぐ来る場合は、忘れた分は服用しないで次の服用時間を待ってください。2回量を一回で摂取しないでください。
- メトロニダゾールを服用している場合は、副作用（顔面紅潮、頭痛、嘔吐、けいれん、動悸または不整脈）の発生を避けるため、治療の12時間前から服用後24～48時間は飲酒またはアルコールを含む薬剤を服用してはいけません。

### 保管上の注意 (Storage Instructions)

- 15～30°Cの室温で保存してください。
- 光、熱、湿度を避けてください。
- 記載された有効期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

### 特別な指示 (Special Instructions)

#### 細菌性膣炎の治療で服用している場合

- あなたが女性で女性のパートナーがいる場合、パートナー（たち）も細菌性膣炎の検査を受け、陽性の場合には治療を受けることをお勧めします。

#### トリコモナス症治療のためにメトロニダゾールを服用している場合

- 以下の時期まで性行為を避けてください。
  - 一回治療の場合はその一週間後、または7日間の治療が完了し、かつ
  - あなたのパートナー（たち）も治療を受け、治療開始から一週間が経過した時まで。これはパートナー（たち）の検査結果が陰性であった場合も同様です。
- 未治療のパートナーと性行為を行った場合、または、あなたご自身またはパートナー（たち）が治療完了前に性行為を行った場合、あなたには再治療が必要になります。ご自身の医療提供者にご相談ください。

ご質問または詳しい情報をご希望の場合は、[www.smartsexresource.com](http://www.smartsexresource.com) にアクセスするか、またはご自身の医療提供者にご連絡ください。