



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

ਮੈਟ੍ਰੋਨਿਡਾਜ਼ੋਲ Metronidazole

ਮੈਟ੍ਰੋਨਿਡਾਜ਼ੋਲ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੈਜੀਨੋਸਿਸ (ਬੀ.ਵੀ.) ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਈ.) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਿਐਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਲਰਜੀਆਂ (Allergies)

- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਟ੍ਰੋਨਿਡਾਜ਼ੋਲ (Flagyl® - ਫਲੈਗਿਲ) ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਗਰਭਕਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰੋਨਿਡਾਜ਼ੋਲ ਨੂੰ ਗਰਭਕਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ), ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟ੍ਰੋਨਿਡਾਜ਼ੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟ੍ਰੋਨਿਡਾਜ਼ੋਲ ਦੀ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਖੁਰਾਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12-24 ਘੰਟੇ ਤਕ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ।
- ਗਰਭਕਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਸਾਵਧਾਨੀ (CAUTION)

- ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ:** ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਹਰਬਲ, ਜਾਂ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਰਦੈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਐਰੀਥੀਮੀਆ (ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨੇਮੀ) ਹੈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਿਗਰ, ਖੂਨ ਜਾਂ ਤੰਤੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
- ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ 24-48 ਘੰਟੇ ਤਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Nyquil® - ਨਾਇਕਵਿਲ)।

Last reviewed by BCCDC Pharmacy on April 2019

page 1 of 3

ਮੈਟ੍ਰੋਨਿਡਾਜ਼ੋਲ (ਚਲਦਾ) Metronidazole (cont'd)

- ਮੈਟ੍ਰੋਨਿਡਾਜ਼ੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲਓ:
 - ਐਂਟੀਅਰਿਥਮਿਕ: ਡਰੋਨੇਡਰੋਨ (Multaq® - ਮੁਲਟਾਕ)
 - ਐਂਟੀਸਾਇਕੋਟਿਕ: ਪੀਮੋਜ਼ਾਈਡ (Orap® - ਓਰੈਪ), ਜ਼ਿਪਰਾਸਿਡੋਨ (Zeldox® - ਜ਼ੈਲਡੌਕਸ)
 - ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ: ਡਾਇਸੁਲਫਿਰੈਮ (Antabuse® - ਐਂਟਾਬਿਊਸ)
 - ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਦੀ ਦਵਾਈ: ਐਂਪ੍ਰੋਨੋਵੀਰ (Agenerase® - ਏਗੈਨਰੇਸ) ਓਰਲ ਸੋਲੀਊਸ਼ਨ, ਲੋਪੀਨੋਵੀਰ/ਰੀਟੋਨੋਵੀਰ (Kaletra® - ਕਾਲੇਟਰਾ) ਓਰਲ ਸੋਲੀਊਸ਼ਨ, ਰੀਟੋਨੋਵੀਰ (Norvir® - ਨੌਰਵਿਰ) ਓਰਲ ਸੋਲੀਊਸ਼ਨ, ਸੈਕਵਿਨਾਵੀਰ (Invirase® - ਇਨਵੀਰੇਜ਼); ਟਿਪਰਾਨਾਵੀਰ (Aptivus® - ਐਪਟੀਵਸ)
 - ਪੈਰਾਸੀਟਿਕ ਵੋਰਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ: ਮੈਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ (Vermox® - ਵਰਮੌਕਸ)
 - ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਵੈਕਸੀਨ (ਵੀਵੋਟਿਫ - Vivotif®)

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Side Effects)

- ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧਾਤ ਵਰਗਾ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਸਵਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧੱਫੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈਣ, ਉਲਝਣ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਿਗ੍ਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਚਲਾਓ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (Instructions for Taking)

- ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰੋਨਿਡਾਜ਼ੋਲ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਲਓ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਖੁੰਝਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਲਓ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਦੁੱਗਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਓ।
- ਮੈਟ੍ਰੋਨਿਡਾਜ਼ੋਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ 24 - 48 ਘੰਟੇ ਤਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਣ ਮਾੜਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਕੜਵੱਲ ਪੈਣੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨੇਮੀ)।

ਮੈਟ੍ਰੋਨਿਡਾਜ਼ੋਲ (ਚਲਦਾ) Metronidazole (cont'd)

ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (Storage Instructions)

- 15 ਅਤੇ 30°C ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
- ਰੋਸ਼ਨੀ, ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਨਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
- ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (Special Instructions)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰੋਨਿਡਾਜ਼ੋਲ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੈਜੀਨੋਸਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ:

- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੈਜੀਨੋਸਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਥਣ/ਸਾਥਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ (ਹਾਂ-ਪੱਖੀ) ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਿਐਸਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰੋਨਿਡਾਜ਼ੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ:

- ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ:
 - ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ; ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ 7 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ
 - ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮੁਕ ਸਾਥੀ(ਆਂ) ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ (ਨੈਗੇਟਿਵ) ਹੀ ਹੋਣ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ www.smartsexresource.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।