

# 甲硝唑 (METRONIDAZOLE)

甲硝唑是用于治疗**细菌性阴道炎 (BV)** 或某些性传播感染疾病 (如滴虫病)的口服抗生素。

## 过敏 (Allergies)

• 如果您对甲硝唑(Flagyl®)或其他抗真菌药物过敏,请告知医务人员。

## 怀孕/哺乳 (Pregnancy and Breast/Chest Feeding)

- 只有在与医务人员讨论后,才可在第一孕期(头三个月)以及第二和第三孕期使用甲硝唑。
- 使用甲硝唑治疗期间应暂停母乳/胸部喂养。如要恢复母乳/胸部喂养,应在最后一次服药后的 24 小时内挤出母乳后丢弃,以便从体内排出药物。

## 警告 (CAUTION)

- 如果您有甲状腺功能减退、肝脏、血液、心脏/心律失常、神经系统方面的疾病,或患有罕见的 遗传疾病柯凯恩综合征,请告知医务人员。
- 与酒精同时使用可能会增加不良反应的风险(潮红、头痛、恶心、呕吐、腹部痉挛、心跳过快或心律不齐、昏厥)。目前的证据对此反应尚无定论。为限制可能出现不良反应的风险,建议在开始治疗前 12 小时、治疗期间以及治疗结束后 24 至 48 小时内避免饮酒及使用含酒精的药物(如 Nyquil®)
- **药物相互作用:** 请注意,本文件不再列出个别药物的相互作用。如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣性药物产品,请与医务人员讨论。

#### 副作用 (Side Effects)

- 您可能会出现头痛、头晕、腹泻、恶心、腹痛、呕吐、消化不良、口中有难闻的金属味以及尿液变深。
- 如果您出现任何神经系统方面的问题,例如癫痫、意识模糊、虚弱、四肢麻木或疼痛,或短暂性 视力问题,请立即联系医务人员,不要开车或操作机器。
- 如果您出现过敏或皮肤反应,如皮疹或瘙痒,请立即联系医务人员。

# 服药说明 (Instructions for Taking)

- 可在饭后服用甲硝唑,减轻胃部不适
- 如果漏服一剂,请在记起来后尽快服用。但是,如果服用下一剂的时间快到了,则跳过漏服的剂量,继续遵照平时的服药时间。不要服双倍剂量。

#### 贮存说明 (Storage Instructions)

- 贮存于 15-30°C 室温下。
- 避光、防高温、防潮。
- 药物超出印明的失效日期,切勿使用。
- 谨防儿童接触。

# 特殊说明 (Special Instructions)

#### 治疗细菌性阴道炎:

如果您是女性,且有女性伴侣,建议您的伴侣接受细菌性阴道炎检查,并在检查结果为阳性时接受治疗。

#### 治疗滴虫病:

- 在满足下列条件之前,不要进行性生活:
  - o 单剂量治疗后已满一周,或您已经完成7天治疗,并且
  - o 您的性伴侣也已接受治疗,而且自治疗开始后已满一周,即使他们的检测结果为阴性亦需治疗。
- 如果您与未经治疗的伴侣发生性关系,或在您或伴侣的治疗完成之前发生性行为,则需重新治疗。 请与医务人员讨论。

如果您有疑问或需要更多信息,请访问 www.smartsexresource.com 或联系医务人员。