



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

Metronidazol Metronidazole

El metronidazol es un antibiótico oral para el tratamiento de la **vaginosis bacteriana (VB)** o para ciertas infecciones de transmisión sexual (ITS), p. ej., la tricomoniasis.

Alergias (Allergies)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna alergia al **metronidazol** (Flagyl®).

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- El metronidazol puede usarse durante el primer trimestre (los primeros tres meses) del embarazo después de consultar a su proveedor de atención médica, y durante el segundo y tercer trimestres del embarazo.
- El metronidazol puede usarse durante la lactancia, lo cual dependerá de la dosis recetada. Si se le receta una sola dosis de 2 gramos de metronidazol, extráigase y deseche la leche materna durante 12 a 24 horas después de su dosis para permitir que el medicamento abandone su cuerpo.
- En el caso de bebés prematuros o de personas con padecimientos de hígado o riñón, consulte a su proveedor de atención médica.

ADVERTENCIA (CAUTION)

- **Interacciones medicamentosas:** informe a su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo. Este documento no contiene todas las interacciones medicamentosas individuales.
- Informe a su proveedor de atención médica si tiene **arritmia o algún padecimiento cardíaco preexistente, así como cualquier trastorno hepático, de la sangre o neurológico.**
- **No tome alcohol ni medicamentos que contengan alcohol** (p. ej., Nyquil®) 12 horas antes de la dosis, durante el tratamiento y de 24 a 48 horas después de la dosis.
- **No tome los siguientes medicamentos mientras toma metronidazol:**
 - **Antiarrítmicos:** dronedarona (Multaq®)
 - **Antipsicóticos:** pimozida (Orap®), ziprasidona (Zeldox®)
 - **Tratamiento para el alcoholismo:** disulfiram (Antabuse®)
 - **Medicamentos para el VIH:** solución oral de amprenavir (Agenerase®), solución oral de lopinavir/ritonavir (Kaletra®), solución oral de ritonavir (Norvir®), saquinavir (Invirase®), tipranavir (Aptivus®)
 - **Tratamiento para lombrices parasitarias:** mebendazol (Vermox®)
 - **Vacuna oral contra la fiebre tifoidea** (Vivotif®)

Metronidazol (continuación) Metronidazole (cont'd)

Efectos secundarios (Side Effects)

- Es posible que presente diarrea, náusea, dolor abdominal, vómito, indigestión, sabor metálico desagradable en la boca, orina oscura, salpullido, comezón, dolor de cabeza, mareo, o debilidad, entumecimiento o dolor en las extremidades.
- Si presenta algún trastorno neurológico como convulsiones, confusión, mareo o problemas visuales transitorios, comuníquese de inmediato con su proveedor de atención médica y no maneje ni opere maquinaria.
- Si presenta alguna reacción alérgica o cutánea, comuníquese de inmediato con su proveedor de atención médica.

Instrucciones para su uso (Instructions for Taking)

- El metronidazol puede tomarse con alimentos para disminuir la molestia estomacal.
- Si se le olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Pero si ya casi es hora de tomar la siguiente dosis, omita la dosis que olvidó y retome su hora habitual de dosificación. No tome una dosis doble.
- Las personas que toman metronidazol no deben beber alcohol ni tomar medicamentos a base de alcohol 12 horas antes y de 24 a 48 horas después del tratamiento debido a una posible reacción adversa (rubor, dolor de cabeza, vómito, calambres, ritmo cardíaco muy acelerado o irregular).

Instrucciones de almacenaje (Storage Instructions)

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones especiales (Special Instructions)

Si toma metronidazol para el tratamiento de la vaginosis bacteriana:

- Si usted es mujer y tiene parejas de sexo femenino, se recomienda que su(s) pareja(s) se someta(n) a una prueba de detección de vaginosis bacteriana y que reciba(n) tratamiento si el resultado es positivo.

Si toma metronidazol para el tratamiento de la tricomoniasis:

- No tenga relaciones sexuales:
 - Hasta una semana después de su tratamiento de una dosis o hasta que haya terminado su tratamiento de 7 días, y
 - Hasta que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento y haya pasado una semana desde el inicio de su tratamiento, aunque los resultados de su prueba sean negativos.
- Tendrá que volver a recibir tratamiento si tiene relaciones sexuales con una pareja que no ha recibido tratamiento, o si tiene relaciones sexuales antes de que el tratamiento suyo o de su pareja haya terminado. Consulte a su proveedor de atención médica.

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite www.smartsexresource.com o comuníquese con su proveedor de atención médica.