



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

Metronidazole Metronidazole

Metronidazole là một loại thuốc kháng sinh dùng qua đường miệng để điều trị viêm âm đạo do vi khuẩn (BV) hoặc một số bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) như trichomoniasis.

Dị Ứng (Allergies)

- Cho chuyên viên y tế biết nếu quý vị bị dị ứng với **metronidazole** (Flagyl®).

Thai Nghén và Cho Con Bú/Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- Có thể dùng Metronidazole trong tam cá nguyệt đầu tiên của thai kỳ (ba tháng đầu) sau khi thảo luận việc này với chuyên viên y tế của quý vị, và trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba của thai kỳ.
- Có thể dùng Metronidazole trong thời gian cho con bú/nuôi con bằng sữa mẹ, tùy thuộc vào liều được kê toa. Nếu quý vị chỉ được kê toa một liều 2 gram metronidazole, hãy bơm và vắt bỏ sữa mẹ trong 12-24 giờ sau khi dùng liều thuốc đó để cho phép thuốc rời khỏi cơ thể quý vị.
- Đối với trẻ sơ sinh non tháng, hoặc những người mẹ bị bệnh gan hoặc thận, hãy hỏi ý kiến chuyên viên y tế của quý vị.

KHUYẾN CÁO (CAUTION)

- **Tương tác thuốc:** Cho chuyên viên y tế biết nếu quý vị đang dùng bất kỳ thuốc theo toa, thuốc không cần toa, thảo dược hoặc chất kích thích giải trí nào. Không phải tất cả các tương tác thuốc riêng lẻ đều được liệt kê trong tài liệu này.
- Cho chuyên viên y tế biết nếu quý vị có bất kỳ **bệnh tim hoặc rối loạn nhịp tim nào từ trước, và/hoặc bất kỳ bệnh tật nào về gan, máu hoặc thần kinh.**
- **Không dùng bia rượu hoặc thuốc có chứa cồn** (ví dụ: Nyquil®) 12 giờ trước khi dùng liều thuốc, trong khi điều trị và 24-48 giờ sau một liều.
- **Không dùng các loại thuốc sau đây trong khi dùng metronidazole:**
 - **Thuốc chống loạn nhịp tim:** dronedarone (Multaq®)
 - **Thuốc chống loạn thần kinh:** pimozide (Orap®), ziprasidone (Zeldox®)
 - **Điều trị chứng nghiện rượu:** disulfiram (Antabuse®)
 - **Thuốc điều trị HIV:** thuốc nước amprenavir (Agenerase®), thuốc nước lopinavir/ritonavir (Kaletra®); thuốc nước ritonavir (Norvir®); saquinavir (Invirase®); tipranavir (Aptivus®)
 - **Điều trị giun sán:** mebendazole (Vermox®)
 - **Thuốc ngừa Thương Hàn qua đường Miệng** (Vivotif®)

Last reviewed by BCCDC Pharmacy on April 2019

page 1 of 2

Metronidazole (tiếp theo) Metronidazole (cont'd)

Tác Dụng Phụ (Side Effects)

- Quý vị có thể bị tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng, ói mửa, khó tiêu, có vị kim loại khó chịu trong miệng, nước tiểu sậm màu, phát ban, ngứa, nhức đầu, chóng mặt, hoặc yếu, tê hoặc đau ở tứ chi của quý vị.
- Nếu quý vị bị bất kỳ rối loạn thần kinh nào như co giật, nhầm lẫn, chóng mặt hoặc các vấn đề thị giác thoáng qua, hãy liên lạc ngay với chuyên viên y tế và không lái xe hoặc vận hành máy móc.
- Nếu quý vị bị bất kỳ phản ứng dị ứng hoặc ngoài da này, hãy liên lạc ngay với chuyên viên y tế của quý vị.

Hướng Dẫn Dùng Thuốc (Instructions for Taking)

- Có thể dùng chung Metronidazole với thức ăn để làm giảm khó chịu dạ dày.
- Nếu quý vị bỏ lỡ một liều, hãy uống ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu thời gian gần với liều tiếp theo của quý vị, hãy bỏ qua liều đó và tiếp tục dùng thuốc như thường lệ. Đừng dùng liều gấp đôi.
- Những người dùng metronidazole không nên uống bia rượu hoặc dùng thuốc có cồn trong 12 giờ trước và 24 - 48 giờ sau khi điều trị vì có thể bị phản ứng bất lợi (đỏ bừng, nhức đầu, ói mửa, chuột rút, nhịp tim rất nhanh hoặc không đều).

Hướng Dẫn Lưu Trữ (Storage Instructions)

- Lưu trữ ở nhiệt độ trong phòng từ 15 đến 30°C.
- Bảo vệ khỏi ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm.
- Không dùng thuốc quá ngày hết hạn đã in.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

Hướng Dẫn Đặc Biệt (Special Instructions)

Nếu dùng metronidazole để điều trị viêm âm đạo do vi khuẩn:

- Nếu quý vị là phụ nữ với bạn tình nữ, (các) bạn tình của quý vị nên đi kiểm tra nhiễm khuẩn âm đạo và điều trị nếu là dương tính.

Nếu dùng metronidazole để điều trị bệnh trichomoniasis:

- Không quan hệ tình dục cho đến khi:
 - Một tuần sau lần điều trị một liều của quý vị, hoặc cho đến khi quý vị hoàn tất điều trị 7 ngày, và
 - (Các) bạn tình của quý vị cũng đã được điều trị, và một tuần đã trôi qua kể từ khi bắt đầu điều trị, ngay cả khi kết quả xét nghiệm của họ là âm tính.
- Quý vị sẽ cần phải điều trị lại nếu quý vị quan hệ tình dục với một bạn tình chưa được điều trị, hoặc nếu quý vị quan hệ tình dục trước khi quý vị hoặc (các) bạn tình của quý vị điều trị xong. Vui lòng thảo luận với chuyên viên y tế của quý vị.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào hay cần thêm thông tin, xin vào xem www.smartsexresource.com hoặc liên lạc với chuyên viên y tế của quý vị.