



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

呋喃妥因 Nitrofurantoin

呋喃妥因（一水合物和粗晶体剂型：Macrobid®）是一种用于治疗或预防下尿路感染的抗生素。

过敏(Allergies)

- 如果您对呋喃妥因(Macrobid®)或丹曲林(Macrobid®)过敏，请告知医务人员。
- 如果您在服用呋喃妥因期间出现瘙痒、荨麻疹、严重过敏反应（面部、眼睛和手脚肿胀、口腔麻刺/肿胀、胸闷、呼吸困难），请联系医务人员。

怀孕/哺乳 (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- 怀孕足月（怀孕 38 至 42 周）、生产和分娩时不应服用呋喃妥因。
- 给出生不满一个月的婴儿哺乳的人不应服用呋喃妥因。
- 婴儿患有名为 G6PD（葡萄糖-6-磷酸脱氢酶）缺乏症的血液疾病的，不应服用呋喃妥因，除非有监控措施。

警告 (CAUTION)

- **药物相互作用：**如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣娱乐产品，请告知医务人员。本文件未一一列出各种药物的相互作用。
- **请咨询医务人员：**
 - 如果您有肾病或泌尿系统异常（例如尿量少）
 - 如果您有肝病，或者之前使用呋喃妥因时有肝脏问题。
 - 如果您出现肺部反应或症状（全身无力或不适、气短、咳嗽、发烧、发冷或胸部疼痛/压迫）。
 - 如果您感到手、手臂、腿或脚刺痛、麻木或灼痛。呋喃妥因在以下情况会增加严重末梢神经病变（神经损伤）的风险：
 - 贫血（红细胞计数低）。
 - 肾病
 - 糖尿病
 - 电解质失衡
 - 维生素 B 缺乏症
 - 神经损伤疾患
 - 如果您出现严重腹泻

Last Reviewed by BCCDC Pharmacy April 2019

Page 1 of 2

呋喃妥因（续） Nitrofurantoin (cont'd)

副作用 (Side effects)

- 您可能会出现头痛、头晕或视力模糊
- 恶心、呕吐、胃部不适或疼痛
- 尿液颜色变化（深色、锈黄色到褐色）

服药说明 (Instructions for Taking)

- 请遵循医务人员的剂量指示。即使症状已经消退，遵医嘱完成治疗也很重要
- 饭后服用或用牛奶吞服，防止胃部不适。
- 如果漏服一剂，请在记起来后尽快服用。但是，如果服用下一剂的时间快到了，则跳过漏服的剂量，继续遵照平时的服药时间。不要服双倍剂量。

贮存说明 (Storage Instructions)

- 贮存于 20°C-25°C 的室温下
- 避光、防高温、防潮。
- 药物超出印明的失效日期，切勿使用。
- 谨防儿童接触。

特殊说明 (Special Instructions)

- 如果您的症状在 3 天内没有改善或正在恶化，请联系医务人员。
- 如果您在完成治疗后仍出现尿液发暗、大便呈灰白色、腹泻（包括大便带血）、恶心、呕吐、食欲不振、上腹疼痛、皮肤或眼睛发黄或警告部分提到的其他身体状况，请联系医务人员。

如果您有疑问或需要更多信息，
请访问 www.smartsexresource.com 或联系医务人员。