



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

Nitrofurantoína Nitrofurantoin

La nitrofurantoína (formulación de monohidrato y macrocristales: Macrobid®) es un antibiótico que se utiliza para el tratamiento o la prevención de infecciones de las vías urinarias inferiores.

Alergias (Allergies)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna alergia o sensibilidad a la **nitrofurantoína** (Macrobid®) o al **dantroleno** (Dantrium®).
- Comuníquese con su proveedor de atención médica si presenta comezón, urticaria, reacciones alérgicas graves (hinchazón del rostro, los ojos, las manos y los pies, hormigueo/hinchazón de la boca, opresión en el pecho, dificultad para respirar) mientras toma nitrofurantoína.

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- La nitrofurantoína **no** debe utilizarse durante el embarazo a término (38 a 42 semanas de gestación), durante el trabajo de parto ni en el alumbramiento.
- La nitrofurantoína **no** debe utilizarse en personas que están dando pecho a bebés menores de un mes de edad.
- La nitrofurantoína **no** debe utilizarse en bebés con un padecimiento de la sangre denominado deficiencia de G6PD (glucosa-6-fosfato deshidrogenasa), a menos que tengan monitoreo a su disposición.

ADVERTENCIA (CAUTION)

- **Interacciones medicamentosas:** informe a su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo. Este documento no contiene todas las interacciones medicamentosas individuales.
- **Consulte a su proveedor de atención médica:**
 - Si tiene una enfermedad renal o anomalías en la orina (p. ej., una menor producción de orina).
 - Si tiene enfermedades hepáticas o si tuvo problemas hepáticos anteriormente debido al uso de nitrofurantoína.
 - Si presenta síntomas o reacciones pulmonares (debilidad o molestia general, falta de aliento, tos, fiebre, escalofríos o presión en el pecho).
 - Si presenta hormigueo, adormecimiento o dolor acompañado de ardor en las manos, los brazos, las piernas o los pies. La nitrofurantoína podría aumentar el riesgo de sufrir de neuropatía periférica grave (daño en los nervios periféricos) en las siguientes situaciones:
 - Anemia (recuento bajo de glóbulos rojos)
 - Enfermedades renales
 - Diabetes
 - Desequilibrios de electrolitos
 - Deficiencia de vitamina B
 - Trastornos de lesiones nerviosas
 - Si presenta diarrea intensa.

Last Reviewed by BCCDC Pharmacy April 2019

Page 1 of 2

Nitrofurantoína (continuación) Nitrofurantoin (cont'd)

Efectos secundarios (Side Effects)

- Podría experimentar dolores de cabeza, mareo o vista borrosa.
- Náusea, vómito, malestar estomacal o dolor.
- Cambios en el color de la orina (color oscuro, de amarillo oxidado a marrón).

Instrucciones para su uso (Instructions for Taking)

- Siga las instrucciones de dosificación de su proveedor de atención médica. Es importante completar el tratamiento como se le indica, incluso si sus síntomas han mejorado.
- Tome le medicamento con alimentos o leche para evitar las molestias estomacales.
- Si se le olvida tomar una dosis, tómla tan pronto como lo recuerde. Pero si ya casi es hora de tomar la siguiente dosis, omita la dosis que olvidó y retome su hora habitual de dosificación. No tome una dosis doble.

Instrucciones de almacenaje (Storage Instructions)

- Almacenar a temperatura ambiente entre 20 y 25 °C.
- Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones especiales (Special Instructions)

- Si sus síntomas no han mejorado en un plazo de tres días o si están empeorando, comuníquese con su proveedor de atención médica.
- Comuníquese con su proveedor de atención médica si presenta orina de color oscuro que persiste incluso después de terminar el tratamiento, heces pálidas, diarrea (incluida la diarrea con sangre), náuseas, vómito, pérdida de apetito, dolor en la parte superior del estómago, amarillamiento de la piel o los ojos, o cualquier otro problema mencionado en la sección titulada “Advertencia”.

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite www.smartsexresource.com o comuníquese con su proveedor de atención médica.