



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

苜星青霉素 G(Bicillin® L-A) 治疗梅毒 Penicillin G Benzathine (Bicillin® L-A) for Treatment of Syphilis

长效苜星青霉素 G (Bicillin® L-A) 是治疗梅毒的首选抗生素。每剂需要肌注两次，在同一次就诊时分两侧臀部肌注，每侧一次。

一剂 240 万单位 Bicillin® L-A 通常足以治疗早期梅毒。但是如果感染已超过一年，或感染时间未知，则需要三剂 240 万单位的 Bicillin® L-A；每周一次，连续三周。

过敏(Allergies)

- 如果您对青霉素类抗生素如青霉素 V-K、阿莫西林 (Amoxil®)或头孢菌素类抗生素如头孢克肟(Suprax®)、头孢曲松(Rocephin®)有过敏史或过敏性即时反应，请告知医务人员。

怀孕/哺乳 (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- 如果您在哺乳期，请咨询医务人员。
- 如果您在怀孕或哺乳期间被诊断出梅毒，接受治疗是非常重要的。
- 如果您在怀孕后半期接受梅毒治疗，请与医务人员讨论需要特殊考虑的事项。

警告 (CAUTION)

- **药物相互作用：**如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣娱乐产品，请告知医务人员。本文件未一一列出各种药物的相互作用。

治疗后的护理 (Care Following Treatment)

- 注射完 Bicillin 后，您需在诊所等候 15 分钟。
- 如果治疗后有任何反应（如皮疹、瘙痒或呼吸困难），请立即通知工作人员。
- 如果离开诊所后出现这些症状，请立即看急诊。

苜星青霉素 G(Bicillin® L-A) 治疗梅毒 (续) Penicillin G Benzathine (Bicillin® L-A) for Treatment of Syphilis (cont'd)

副作用 (Side effects)

- 注射部位可能会感到轻微的暂时性疼痛
- 治疗后您可能会腹泻。
- **雅-赫氏反应(Jarisch-Herxheimer reaction):** 发烧、发冷、头痛或疲劳。
 - 雅-赫氏反应是治疗早期梅毒后若干小时内可能出现的一系列暂时性副作用；不过不是每个人都会出现这种反应。
 - 不要惊慌，这不是过敏反应，通常会在 24 小时内结束。
 - 如果需要缓解症状，您可以服用对乙酰氨基酚 (Tylenol®) 或布洛芬(Advil®)。
 - 晚期梅毒治疗后很少发生这种反应。
- 如果上述任何副作用持续或恶化，请联系医务人员。

早期梅毒与晚期梅毒 (Early Syphilis vs Late Syphilis)

治疗和复诊建议基于梅毒在您体内存在的时间长短。医务人员会告诉您是否患有早期梅毒或晚期梅毒，以及需要何种治疗。

- 治疗
- 特殊说明
- 伴侣后续措施
- 后续检测

见第 3 页表格

如果您有疑问或需要更多信息，
请访问 www.smartsexresource.com 或联系医务人员。

苜星青霉素 G (Bicillin® L-A) 治疗梅毒 (续)

Penicillin G Benzathine (Bicillin® L-A) for Treatment of Syphilis (cont'd)

	早期梅毒	晚期潜伏梅毒
定义	<ul style="list-style-type: none"> 可能有生殖器/口腔溃疡或皮疹等症状 可能没有任何症状，但仍会传染 感染持续时间：一年以内 	<ul style="list-style-type: none"> 梅毒感染的潜伏或“隐藏”阶段，此时没有症状且不会传染，但感染不加治疗可能会引起内部损伤 感染持续时间：超过一年或持续时间未知
治疗	<ul style="list-style-type: none"> 苜星青霉素 G (Bicillin® L-A) 240 万单位 x 1 剂 每剂需要肌注两次，在同一次就诊时分两侧臀部肌注，每侧一次 在某些情况下，如怀孕、艾滋病毒混合感染，可能需要用额外的 Bicillin LA® 治疗 如果您有梅毒症状，如疼痛或皮疹，这些症状应该在 2-4 周内消失。 如果症状在这段时间内没有消退，请咨询医务人员。 	<ul style="list-style-type: none"> 苜星青霉素 G (Bicillin® L-A) 240 万单位 x 每周 3 剂 (间隔 7 天)，连续 3 周。 每剂需要肌注两次，在同一次就诊时分两侧臀部肌注，每侧一次 全部治疗=三周内 720 万单位。
伴侣通知和后续措施	<ul style="list-style-type: none"> 在您确诊前 3 个月内的所有性伴侣，作为早期梅毒的接触者，都需要接受治疗、测试和检查。 在您确诊前 3 至 12 个月内的性伴侣需要接受测试和检查。 医务人员或公共卫生护士将与您联系，讨论伴侣通知选项和后续措施。 	<ul style="list-style-type: none"> 已被诊断患有梅毒的人，其所有长期性伴侣和子女，都需要接受检测 (梅毒血液检测)。 医务人员或公共卫生护士将与您联系，确认必要的后续措施。
特殊说明	<ul style="list-style-type: none"> 治疗后 2 周 (14 天) 内不要发生性行为 确保您的性伴侣，即过去三个月与您有过口交、肛交或阴道性交的任何人，都已接受梅毒治疗，即使他们的检测结果是阴性也要接受治疗 如果有以下情况，请告知医务人员： <ul style="list-style-type: none"> 您与未经治疗的伴侣有性行为或 在您或伴侣的治疗完成之前有性行为。 	<ul style="list-style-type: none"> 开始治疗后 2 周 (14 天) 内不要发生性行为 完成为期三周的治疗对治疗感染和预防并发症非常重要。
后续血液测试	<ul style="list-style-type: none"> 每 3-6 个月一次，取决于再次感染的风险。与医务人员讨论您最好多久检测一次。 注意：您的梅毒 EIA 筛查测试通常会终生呈阳性 (反应性)。梅毒 RPR 在治疗后应缓慢下降。如果没有出现这种情况，可能有必要再次接受治疗。医务人员会提供建议。 	<ul style="list-style-type: none"> 医务人员会在您最后一次就诊时讨论后续检测的建议。 注意：您的梅毒 EIA 筛查测试通常会终生呈阳性 (反应性)。将会进行额外的血液检测，确保感染得到充分治疗。