

## 치료를 마치면 어떻게 되나요? What happens after you finish treatment?

약을 모두 복용하면, 결핵으로 다시  
아프시지는 않을 것입니다.

치료를 마친 후 건강 모니터 목적으로  
클리닉에 다시 오셔야 할 수는 있습니다.

다시 아프고 결핵 증상이 있으면, 가정의나  
클리닉에 전화하여 예약하십시오.

## 질문이 있으면 어디로 연락하나요?

**Where can you call if you have  
questions?**

담당 의료 제공자:

Tel: \_\_\_\_\_

**BC 질병 통제 센터**

**결핵 클리닉:**

**BC Centre for Disease Control  
TB Clinics:**

밴쿠버 결핵 서비스 클리닉  
655 West 12<sup>th</sup> Avenue  
604-707-2692

뉴웨스트민스터  
100-237 Columbia Street East  
604-707-2698

[www.bccdc.ca](http://www.bccdc.ca)



**BC Centre for Disease Control**  
An agency of the Provincial Health Services Authority

# 폐외 결핵 Extrapulmonary Tuberculosis

## 폐외 결핵이란?

### What is extrapulmonary tuberculosis (TB)?

결핵(TB)은 세균이 일으키고 공기를 통하여 퍼집니다.

결핵은 신체 어느 부위에서도 발생할 수 있으나 폐에서 가장 흔합니다. **폐가 아닌 다른 신체 부위에 생긴 결핵을 폐외 결핵이라고 합니다.**

때로, 결핵은 두 군데 이상에서 동시에 자랍니다.

좋은 소식: **결핵은 완치가 가능합니다!**  
브리티시 컬럼비아 주에서, 결핵약은 무료입니다.

## 폐외 결핵의 증상은?

### What are the symptoms of extrapulmonary TB disease?

증상은 결핵이 생긴 신체 부위에 따라 달라집니다.

신체 부위	나타날 수 있는 증상
샘	목 부위 덩어리
뼈	뼈나 등 통증
관절	통증, 빨개짐, 부기
신장	소변 시 통증, 혼탁한 소변
뇌	두통, 뻣뻣한 목, 머리나 눈 움직일 시 아픔
심장 내층	호흡 곤란, 흉부 통증 가능

장기      복통과 배변 변화 가능

다음에 있을 수도 있습니다.

- 열
- 야간 발한
- 식욕 상실
- 체중 저하
- 허약감 또는 매우 피곤

## 폐외 결핵이 있는지 어떻게 아나요?

### How do you know you have extrapulmonary TB?

결핵 검사는 발병한 신체 부위에 따라 달라집니다. 담당 의료 제공자가 상담해드립니다.

모든 정보를 보여주는 검사는 시간이 걸립니다.

## 친구 가족, 다른 사람이 감염되지 않게 하는 방법은?

### How can you keep friends, family and others safe?

담당 의료 제공자는 환자의 폐에도 결핵이 있는 것은 아닌지 확인합니다.

폐에 결핵이 없음이 확인될 때까지, 2 주간 또는 그 이상 자택 격리가 요구될 수도 있습니다.

자택 격리에 관한 자세한 정보는 HealthLink BC 웹사이트를 보십시오.

<http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/hfile51c.stm>

## 폐외 결핵은 어떻게 치료되나요?

### How is extrapulmonary TB treated?

결핵은 **결핵약**으로 완치할 수 있습니다. 대부분 환자는 치료에 **6~9 개월**이 소요됩니다. **때로 더 길게** 약을 복용해야 하는 경우도 있습니다.

호전된 기분이어도 지시대로 약을 복용하는 것이 중요합니다.

담당 의료 제공자는 결핵약 복용 기간을 알려드립니다. 이 기간은 약 종류, 약에 대한 환자의 반응, 신체 치유 기간 등에 따라 달라집니다.

**정기적으로 클리닉에** 오셔서 담당 의료 제공자를 만나 추가 약을 받으셔야 합니다.

**혈액 검사**는 환자의 건강을 지켜보려고 실시합니다.