

### 您有患病风险吗？ (Are you at risk?)


结核皮试用于检测结核感染。在某些情况下，IGRA 结核病抽血检查可提供更多信息。如果您感染了结核菌，有罹患结核病的风险，医生可能会要求您接受 IGRA 结核病抽血检查。在某些情况下，两种检查都会用到。有时结核皮试是首选（例如需要反复检查时）。

可能会建议以下人群做 IGRA 结核病抽血检查：

- 结核皮试呈阳性，且曾经接种卡介苗。
- 结核皮试呈阴性，且免疫系统很弱。
- 有特定的病症（如刚开始透析或刚做过移植手术）。

### 结核病是如何传播的？ (How is TB spread?)

当肺结核病患者咳嗽、说话、唱歌或打喷嚏时，结核菌通过空气在人际间传播。如果您吸入带有结核菌的空气，就可能感染结核菌，并发展成潜伏性结核感染或活动性结核病。



**潜伏性结核感染**指肺部吸入结核菌，但免疫系统阻止了结核菌繁殖致病的情况。结核菌处于休眠（潜伏）状态。有潜伏性结核感染的人没有生病的感觉，也没有任何症状。他们不会向其他人传播结核菌。实际上，在做结核皮试或抽血检查之前，他们甚至不知道体内有病菌。



**活动性结核病**发生在肺部吸入结核菌，且免疫系统无法阻止结核菌生长、繁殖和致病时。

**活动性结核病的**征兆和症状是：咳嗽 2-3 周或更久、痰中带血、发烧、盗汗、没有胃口、不明原因的体重减轻、疲倦、胸痛和气短。

## 为什么做结核病抽血检查? (Why get a TB Blood Test?)

如果您过去接种过卡介苗，IGRA 结核病抽血检查可以排除假阳性结核皮试。如果您的免疫系统很弱，IGRA 结核病抽血检查可有助于排除假阴性结核皮试。一次 IGRA 结核病抽血检查有助于告诉您体内有无结核菌。



结核菌可能会在您的体内沉睡终身，也可能重新活跃，开始繁殖，让您患上活动性结核病。您无法知道是否或何时会发生这种情况。一个人的免疫系统虚弱时，发生这种情况的概率就会增高，因为要靠免疫系统把结核菌保持在沉睡状态，阻止其繁殖。

如果您有潜伏性结核感染，您可以咨询护士或医生有关预防活动性结核病的最佳方式。

## 我去哪里做结核病抽血检查? (Where do I get a TB blood test?)

化验室需接受过这项检查的专门培训，必须能够现场处理样本。因此，只有 BC 省的一些医院化验室能做这项检查。在某些情况下，您可能需要去离家稍远的地方才能做这项抽血检查。您的护士或医生会告诉您最近的医院化验室在哪里。

在 BC 省，结核病抽血检查大多免费。针对就业和入学的结核病抽血检查需收费。

## 预约检查 (Booking the test):

可以随时去做，也可能需要预约。这取决于您去的化验室。如果您需要接种活性疫苗，则应该在活性疫苗接种后当天或 4 周做检查。如果您最近接种了疫苗，请咨询护士或医生。

## 检查结果和后续步骤 (Test Results and Next Steps):

通常需要 1 - 2 周才会知道检查结果。关于您将如何得知检查结果，请咨询护士或医生。

**结核病抽血检查阴性**通常意味着您体内没有结核菌。如果您的皮试呈阳性，这意味着您的皮试是假阳性。

**结核病抽血检查阳性**则意味着您体内可能有结核菌。护士或医生可能会：

- 询问您有无活动性结核病的任何征兆或症状
- 让您拍 X 光胸片
- 如果需要排除活动性结核病，则需采集痰（肺部粘液）样。



如需更多信息，请访问 [www.bccdc.ca/TBVideoEnglish](http://www.bccdc.ca/TBVideoEnglish)，观看“结核菌：狡猾的世界旅行者”。该片还有韩语、国语、旁遮普语、他加禄语和越南语版本。