



BC Centre for Disease Control  
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard  
TB Services Fax

www.bccdc.ca

604 707 2692  
604 707 2690

## CLOFAZIMINE CLOFAZIMINE

La clofazimine est un antibiotique prescrit pour traiter la tuberculose (la TB), la lèpre et d'autres infections connexes.

### Quand faut-il en prendre? (When should I take this?)

- Prenez ce médicament avec de la nourriture ou du lait pour favoriser son absorption et éviter les maux d'estomac.
- Prenez ce médicament tous les jours à la même heure. Ceci vous permettra de ne pas l'oublier.

### Comment faut-il le prendre? (How should I take this?)

- Il est très important que vous preniez la clofazimine régulièrement.
- Suivez la posologie recommandée par votre médecin.

### Que faire si je manque une dose? (What should I do if I miss a dose?)

- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Toutefois, s'il est presque l'heure de prendre la dose du lendemain, sautez la dose manquée.
- **Ne prenez pas une double dose.**

Si vous **prenez d'autres médicaments**, y compris un médicament en vente libre (obtenu sans ordonnance), parlez-en à votre médecin, infirmier(ère) ou pharmacien(ne).

Évitez l'**exposition prolongée au soleil** ou aux rayons ultraviolets artificiels (p. ex. les lampes solaires ou lits de bronzage) pendant la prise de ce médicament. La clofazimine peut vous rendre plus sensible au soleil. Appliquez un écran solaire et portez des vêtements de protection.

### Quels sont les effets secondaires potentiels? (What are some possible side effects?)

- nausée, vomissement et diarrhée;
- vertige ou somnolence;
- sécheresse cutanée ou oculaire; ou
- démangeaison.

## CLOFAZIMINE (suite) CLOFAZIMINE (cont'd)

**Mise en garde (Caution) : Appelez votre médecin ou infirmier(ère) immédiatement en présence des symptômes suivants :**

- fatigue ou faiblesse inhabituelles;
- nausées et vomissements persistants;
- peau ou yeux jaunâtres (ou même orangés si une décoloration rougeâtre ou noir brunâtre est présente);
- graves douleurs abdominales ou maux d'estomac;
- selles sanglantes ou noires et poisseuses;
- évanouissement ou rythme cardiaque irrégulier; ou
- éruption cutanée.

**Avisez votre médecin si vous éprouvez des symptômes inhabituels ne figurant pas dans ce feuillet d'information.**

Ce médicament peut changer la composition des larmes, de la salive, de la transpiration, de l'urine, des selles, de la surface de l'œil et du pourtour des paupières et changer leur **coloration allant du rouge au noir brunâtre**. Il peut également décolorer la peau de rouge à brune, comme pour un bronzage. Cette réaction est bénigne et réversible, mais pourrait persister pendant un certain temps après le traitement.

**Que faut-il savoir de plus sur la prise de la clofazimine? (What else do I need to know about taking clofazimine?)**

- Prévenez votre médecin ou votre infirmier(ère) si vous êtes **enceinte**, envisagez une grossesse ou si vous souhaitez **allaiter** votre enfant.
- Informez votre médecin ou votre infirmier(ère) si vous portez des lentilles cornéennes souples.

**Où dois-je conserver ce médicament? (Where should I store this medication?)**

- Ne le laissez pas à la portée des enfants.
- Protégez-le de la lumière.
- Sous forme de capsule : conservez-le à température ambiante dans un récipient hermétique et dans un endroit frais et sec.

**Qui faut-il appeler si j'ai d'autres questions? (Where do I call if I have any other questions?)**

Votre médecin, clinique ou bureau de santé publique : \_\_\_\_\_  
La clinique des services chargés de la tuberculose à Vancouver : 604-707-2692  
La clinique des services chargés de la tuberculose à New Westminster : 604-707-2698  
Les services de vaccinations et de pharmacie du BCCDC : 604-707-2580