



에탐부톨 ETHAMBUTOL

에탐부톨은 결핵(TB)과 때로 기타 관련 감염 치료에 사용되는 항생제입니다.

언제 복용해야 하나요? (When should I take this?)

- 이 약은 매일 같은 시간에 복용하십시오. 그러면 약 복용을 기억하시는 데 도움이 됩니다.

어떻게 복용해야 하나요? (How should I take this?)

- 이 약은 규칙적으로 복용하시는 것이 매우 중요합니다.
- 의사의 지시대로 복용하십시오.

복용을 1회 잊어버리면 어떻게 해야 하나요? (What should I do if I miss a dose?)

- 복용을 잊으신 경우, 기억나는 대로 바로 복용하십시오. 다음날 복용 시간이 거의 다 되었다면, 빠뜨린 용량을 건너뛰십시오.
- 두 배로 복용하지 마십시오.

복용 시 피해야 하는 것이 있나요? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- 에탐부톨은 다음 제제를 복용하기 최소 4시간 전 또는 4시간 후에 복용하셔야 합니다.
 - 알루미늄 함유 제산제 또는 보조제

처방전 없이 살 수 있는(비처방) 제품을 포함하여 다른 약을 복용하고 계시면 담당 의사, 간호사, 약사에게 알려주세요.

발생할 수 있는 부작용은? (What are some possible side effects?)

- 배탈이나 구역, 구토

주의 사항(Caution): 다음 증상이 나타나면 즉시 담당 의사나 간호사에게 연락하십시오.

- 시력 변화 또는 흐려짐
- 빨간색과 녹색 구별 어려움
- 발진

이 안내지에서 언급하지 않은 이례적 증상이 있으시면 담당 의사에게 알려주세요.

에탐부톨(계속) ETHAMBUTOL (cont'd)

에탐부톨 복용에 관하여 달리 알아두어야 할 사항은? (What else do I need to know about taking Ethambutol?)

- 다음 증상이 있으면 담당 의사에게 알려주세요. 눈 문제 또는 질환, 통풍, 신장 질환, 간 질환.
- 담당 의사가 지시한 모든 검사실 및 시력 검사를 받고 담당 의사나 간호사와의 예약 진료에 모두 가시는 것이 중요합니다.
- 임신 중이거나 임신 계획이 있거나 모유 수유를 원하신다면 담당 의사나 간호사에게 알려주세요.

이 약은 어디에 보관해야 하나요? (Where should I store this medication?)

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 햇빛으로부터 보호하십시오.
- 정제: 시원하고 건조한 장소에서 실온에 보관하십시오.
- 물약: 시원하고 건조한 장소에서 실온에 보관하십시오. 잘 흔들어서 사용하십시오.

다른 질문이 있으면 어디로 연락하나요? (Where do I call if I have any other questions?)

담당 의사, 클리닉이나 다음 보건소에 연락하십시오. _____

밴쿠버 결핵 서비스 클리닉:

604-707-2692

뉴웨스트민스터 결핵 서비스 클리닉:

604-707-2698

BCCDC 백신/약국 서비스:

604-707-2580