



## 에티오나마이드 ETHIONAMIDE

에티오나마이드는 결핵(TB) 치료에 사용하는 항생제입니다.

### 언제 복용해야 하나요? (When should I take this?)

- 소화 불량을 줄이기 위해 음식이나 우유와 함께 복용하십시오.
- 약을 매일 같은 시간에 복용하십시오. 그러면 약 복용을 기억하는 데 도움이 됩니다.

### 어떻게 복용해야 하나요? (How should I take this?)

- 규칙적 복용이 매우 중요합니다.
- 의사의 지시대로 복용하십시오.

### 약 복용을 걸렀으면 어떻게 해야 하나요? (What should I do if I miss a dose?)

- 약 복용을 거르셨으면 생각나는 대로 바로 복용하십시오. 그러나 다음 날 복용 시간이 거의 다 됐으면 그냥 거르십시오.
- 두 배로 복용하지 마십시오.

### 복용 시 피해야 할 것이 있나요? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- 알코올

비처방 제품을 포함하여 다른 약을 복용 중이시면 의사나 약사에게 알려주십시오.

### 어떤 부작용이 있을 수 있나요? (What are some possible side effects?)

- 두통
- 구역 및 구토
- 설사, 배앓이
- 금속성 입맛
- 과도한 침 분비
- 어지럼 또는 졸음
- 체중 감소
- 구강 과민 또는 입안이 험
- 손이나 발이 화끈거림, 저림 또는 무감각함

의사가 피리독신(pyridoxine)(비타민 B6)을 처방하여 에티오나마이드의 부작용을 줄일 수도 있습니다. 손이나 발이 화끈거리거나, 저리거나, 감각이 없으면 의사에게 말씀하십시오.

## 에티오나미드(계속) ETHIONAMIDE (cont'd)

**주의 (Caution):** 다음 증상이 있으시면 의사나 간호사에게 즉시 연락하십시오.

- 눈이 침침하거나 시력이 약해짐(안구 통증이 있거나 없음)
- 발열
- 구역 또는 구토가 지속됨
- 피부나 눈이 노랗게 됨
- 평소와 달리 피곤하거나 힘이 없음
- 식욕 상실
- 질은 소변
- 정신이나 기분, 행동의 변화가 새로 생기거나 악화함
- 발진, 가려움 또는 두드러기

**에티오나미드 복용에 관하여 알아두어야 할 기타 사항은 무엇인가요? (What else do I need to know about taking ethionamide?)**

- 당뇨병이 있는 분은 이 약을 복용하시는 동안 혈당을 정기적으로 재십시오.
- 갑상선약을 복용하는 분은 갑상선 기능 정기 검사를 권합니다.
- 임신하셨거나, 임신을 계획하고 있거나, 아기에게 모유 수유를 원하는 분은 의사에게 말씀하십시오.

**이 약은 어디에 보관해야 하나요? (Where should I store this medication?)**

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선이 닿지 않게 하십시오.
- 약병을 단단히 잠가 상온의 선선하고 건조한 곳에 보관하십시오.

**기타 궁금한 점이 있으면 어디에 전화하나요? (Where do I call if I have any other questions?)**

담당 의사나 클리닉 또는 보건소: \_\_\_\_\_

밴쿠버 TB 서비스 클리닉: 604-707-2692

뉴웨스트민스터 TB 서비스 클리닉: 604-707-2698

BCCDC 백신 약국 서비스: 604-707-2580