



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

리파펜틴과 아이소니아지드 RIFAPENTINE and ISONIAZID

리파펜틴과 아이소니아지드는 잠복(비활동성 또는 휴면) 결핵(TB) 감염을 치료하고 감염이 활동성 결핵으로 진행되는 것을 방지하기 위하여 병용하는 두 가지 항생제입니다.

어떻게 복용해야 하나요? (How should I take this?)

- 리파펜틴과 아이소니아지드는 **12주간 주 1회씩 투여합니다(총 12회 용량)**.
- 이 정제들은 훈련된 의료 제공자가 있는 곳에서 입으로 복용합니다. 이를 '직접 관찰 예방 요법'(Directly Observed Preventative Therapy, DOPT)이라고 합니다.
- 이 정제들은 간단한 간식(예: 차와 토스트)과 함께 복용하여야 위에 부담이 덜합니다.

약 복용이나 진료 예약 또는 방문을 잊으면 어떻게 해야 하나요? (What should I do if I miss a dose, appointment, or visit?)

- 처방된 용량을 모두 복용하는 것이 중요합니다. 용량을 거르거나 건너뛰면 이 요법의 효능이 떨어질 수 있습니다.
- 용량 복용을 1회 잊으시면 가능한 한 빨리 결핵 의료 제공자에게 말씀하셔서 거른 용량을 어떻게 관리해야 하는지 지시를 받으십시오.

복용 시 피해야 하는 것이 있나요? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- 음주를 삼가 간 문제를 최소화하는 것이 가장 좋습니다.
- 알루미늄이나 마그네슘 함유 제산제를 복용하시는 경우 아이소니아지드 복용 후 최소한 1시간 뒤에 복용하십시오.

리파펜틴과 아이소니아지드 복용 전, 현재 복용 중이신 모든 약(비처방 약 포함)을 의사나 간호사, 약사에게 반드시 알려주십시오. 의사나 약사와 상의 없이 새 약 복용을 시작하지 마십시오.

이 치료법에는 어떤 부작용이 있을 수 있나요? (What are some possible side effects of this treatment?)

- 과민 반응(열, 두통, 현기증, 근육통, 독감 같은 증상, 발진, 피부 반응)
- 위 문제(메스꺼움, 구토, 설사, 식욕 상실)
- 이례적인 피로나 허약
- 질은(콜라나 차 색깔의) 소변
- 피부나 눈 흰자위의 노래짐
- 손이나 발의 화끈거림, 저림 또는 무감각
- 이 약을 복용하면 눈물, 침, 가래, 땀, 소변, 대변, 모유, 피부, 치아, 혀가 붉은 오렌지 색으로 변할 수도 있습니다. 이는 해롭지 않지만, 소프트 콘택트렌즈와 의치가 영구 변색되기도 합니다.

위 부작용 중 어느 하나이든 또는 그 외 무엇이든 이례적인 증상이 나타나면 결핵 의료 제공자에게 말씀하십시오.



**리파펜틴과 아이소니아지드 복용에 관하여 달리 알아두어야 할 사항은 무엇인가요?
(What else do I need to know about taking rifapentine and isoniazid?)**

- 담당 의사가 지시한 모든 검사실 검사를 받고 담당 의사나 간호사와 하신 예약에 모두 가시는 것이 중요합니다.
- 임신 중이거나, 임신 계획이 있거나, 아기에게 모유 수유를 원하시면 담당 의사나 간호사에게 말씀하십시오.
- 리파펜틴은 피임제의 효능을 저하시킬 수 있습니다. 다른 피임법(콘돔/질 격막 같은 차단 방법)을 사용하십시오. 리파펜틴 중단 후 최소한 28일간 차단 방법을 계속 사용하십시오. 경구 피임 호르몬 휴지 일수를 4일로 줄이십시오.
- 이 치료법과 함께 피리독신(비타민 B6)을 처방하여 손이나 발의 화끈거림이나 저림, 무감각을 방지합니다.

기타 궁금한 것이 있으면 어디로 전화하나요? (Where do I call if I have any other questions?)

결핵 진료 제공자: _____

밴쿠버 결핵(TB) 서비스 클리닉: 604-707-2692

뉴웨스트민스터 결핵(TB) 서비스 클리닉: 604-707-2698

BCCDC 백신 및 약국 서비스: 604-707-2580