



## 异烟肼 ISONIAZID

异烟肼(Isoniazid)是用于预防或治疗结核病 (TB) 的抗生素。

### 我该什么时候服用此药物 (When should I take this)?

- 饭前 1 小时以上或饭后 2 小时以上空腹服用
- 每天同一时间服用此药物。这将帮助您记得服药。

### 我该如何服用此药物 (How should I take this)?

- 定期服用异烟肼非常重要。
- 遵医嘱服用。

### 如果漏服一次，我该怎么做 (What should I do if I miss a dose)?

- 如果您漏服一次，想起时应尽快服药。但是如果快到第二天的服药时间，则不必补服。
- 请勿服用双倍剂量。

### 服用此药物时我应该避免什么吗 (Is there anything I should avoid when taking this)?

- 酒
- 含有铝或镁的抗酸剂。服用异烟肼后 1 小时以内请勿服用。

如果您正在服用任何其他药物，包括不需处方可以出售的（非处方）药物，请告知医生、护士和药剂师。

### 有什么可能的副作用 (What are some possible side effects)?

- 如果您的手或脚有烧灼、刺痛或麻木感，请告知您的医生。

## 异烟肼（续） **ISONIAZID (cont'd)**

**警告(Caution):** 如果您出现以下症状, 请立即致电医生或护士

- 异常疲劳或虚弱
- 发烧
- 食欲不振
- 呕心（想吐）
- 胃部不适或腹泻
- 小便黄赤
- 皮肤或眼睛变黄
- 皮疹

如果您出现任何本信息表上未提及的异常症状, 请告知医生。

**关于服用异烟肼, 我还需要知道什么(What else do I need to know about taking isoniazid)?**

- 医生开出的所有实验室检验以及与医生或护士的所有约诊都很重要, 应按时做检验及就诊。
- 如果您已怀孕、计划怀孕或您想用母乳喂养孩子, 请告知医生或护士。

**此药物应如何存放(Where should I store this medication)?**

- 谨防儿童接触
- 避光
- 片剂或液体制剂: 放在凉爽、干燥处, 室温保存。

**如果我有其他问题, 应该致电给谁(Where do I call if I have any other questions)?**

您的医生、诊所或公共卫生单位: \_\_\_\_\_

温哥华结核病服务诊所: 604-707-2692

新西敏市结核病服务诊所: 604-707-2698

BC 省疾病控制中心疫苗与药房服务: 604-707-2580