



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

www.bccdc.ca

604 707 2692
604 707 2690

LÉVOFLOXACINE LEVOFLOXACIN

La lévofloxacine est un antibiotique prescrit pour traiter des infections bactériennes.

Quand faut-il en prendre? (When should I take this?)

- La lévofloxacine peut être prise avec ou sans nourriture.
- Prenez-la tous les jours à la même heure avec un verre d'eau plein de 8 oz (240 ml). Ceci vous permettra de ne pas l'oublier.
- Buvez plusieurs verres de liquides tout au long de la journée.

Comment faut-il la prendre? (How should I take this?)

- Il est très important que vous preniez la lévofloxacine selon les recommandations de votre médecin.

Que faire si je manque une dose? (What should I do if I miss a dose?)

- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Toutefois, s'il est presque l'heure de prendre la dose du lendemain, sautez la dose manquée.
- **Ne prenez pas une double dose.**

Que faut-il éviter lors de la prise de ce médicament? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- Prenez la lévofloxacine au moins **2 heures avant ou 2 heures après** :
 - les antiacides à base d'aluminium, de calcium ou de magnésium (p. ex. Maalox^{MD}, Mylanta^{MD}, Roloids^{MD});
 - le sucralfate (médicament pour traiter les ulcères);
 - les suppléments à base de calcium, fer ou zinc.

Avant de prendre la **LÉVOFLOXACINE**, veuillez informer votre médecin, infirmier(ère) ou pharmacien(ne) de tous les médicaments que vous prenez (y compris les médicaments en vente libre). NE prenez PAS un nouveau médicament sans avoir consulté votre médecin ou pharmacien(ne).

Quels sont les effets secondaires potentiels? (What are some possible side effects?)

- nausée ou diarrhée;
- maux de tête;
- somnolence ou étourdissements;
- insomnies.

LÉVOFLOXACINE (suite) LEVOFLOXACIN (cont'd)

Mise en garde (Caution) : Appelez votre médecin ou infirmier(ère) immédiatement en présence des symptômes suivants :

- éruption cutanée, urticaire ou difficultés respiratoires;
- rythme cardiaque irrégulier ou douleur dans la poitrine;
- douleur aux muscles, tendons ou articulations;
- douleur, brûlures, fourmillement, engourdissement, faiblesse dans les mains ou dans les pieds;
- peau ou blanc des yeux jaunâtres;
- changement ou perturbations visuelles;
- diarrhée importante ou sanglante;
- tout autre effet secondaire persistant.

Avisez votre médecin si vous éprouvez des symptômes inhabituels ne figurant pas dans ce feuillet d'information.

La lévofloxacine peut causer de la somnolence ou des vertiges. Soyez prudent lorsque vous conduisez, faites fonctionner des machines ou si vous effectuez des tâches dangereuses.

La lévofloxacine rend la peau plus susceptible aux coups de soleil. Évitez l'exposition prolongée au soleil ou aux rayons ultraviolets artificiels (p. ex. les lits de bronzage ou lampes solaires). Appliquez un écran solaire ou portez des vêtements de protection.

Si vous êtes diabétique, assurez-vous de faire vérifier régulièrement le taux de glycémie dans votre sang pendant la prise de ce médicament.

Prévenez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez une grossesse ou si vous souhaitez allaiter votre enfant.

Où faut-il conserver ce médicament? (Where should I store this medication?)

- Ne le laissez pas à la portée des enfants.
- Sous forme de comprimé : conservez-le à température ambiante (entre 15 et 30 °C) dans un endroit frais et sec. Protégez-le de la lumière.

Qui faut-il appeler si j'ai d'autres questions? (Where do I call if I have any other questions?)

Votre médecin, clinique ou bureau de santé publique : _____
La clinique des services chargés de la tuberculose à Vancouver : 604-707-2692
La clinique des services chargés de la tuberculose à New Westminster : 604-707-2698
Les services de vaccinations et de pharmacie du BCCDC : 604-707-2580