

Simplified Chinese

## 左氧氟沙星 **LEVOFLOXACIN**

左氧氟沙星是一种用于治疗细菌感染（包括结核病）的抗生素。

**我该什么时间服用此药 (When should I take this)?**

- 左氧氟沙星可在餐前或餐后服用。
- 用8盎司（240毫升）的一整杯水。
- 在每天同一时间服药。这有助于您记得服药。
- 一天当中喝多杯水。

**我该如何服用此药(How should I take this)?**

- 严格按医嘱服用左氧氟沙星非常重要。

**如果漏服一次，我该怎么做 (What should I do if I miss a dose)?**

- 如果漏服一次，请在想起时尽快服用。但是，如果快到该服第二天的剂量时，则不必补服。
- 请勿服用双倍剂量。

**服用此药有无禁忌(Is there anything I should avoid when taking this)?**

- 应在服用以下药物至少 **2小时前或2小时后**服用左氧氟沙星：
  - 含铝、钙和/或镁的抗酸剂（如Maalox®, Mylanta®, Rolaids®）。
  - 硫糖铝（溃疡药）
  - 含钙、铁或锌的补充剂。

在服用左氧氟沙星前，务必告诉医生、护士或药剂师您正在服用的所有药物（包括非处方药）。在咨询医生或药剂师之前，切勿开始服用新药物。

**可能有哪些副作用(What are some possible side effects)?**

- 恶心、呕吐、腹泻
- 头痛
- 头晕目眩
- 失眠

## 左氧氟沙星 LEVOFLOXACIN

**警告 (Caution):** 如果您出现以下症状, 请立即致电您的医生或护士:

- 皮疹、荨麻疹或呼吸困难
- 心跳不规则或胸痛
- 肌肉、肌腱或关节疼痛
- 手或脚疼痛、灼痛、刺痛、麻木、无力
- 皮肤或眼白发黄、尿色黄赤、呕吐。
- 视力改变或障碍
- 严重或血性腹泻
- 癫痫发作
- 任何其他持续的副作用

如果您出现此信息表中未提及的任何异常症状, 请告诉医生。

左氧氟沙星可导致头晕目眩。在开车、操作机器或进行危险活动或需要精神警觉或协调的工作时要小心。

左氧氟沙星可导致皮肤容易晒伤。避免过度接触阳光或人造紫外线（如晒黑床、太阳灯）。使用防晒霜或穿防护服。

糖尿病患者在服用此药期间要定期检查血糖水平。

如果您怀孕、计划怀孕或希望用母乳喂养宝宝, 请告诉医生。

**这种药物应如何存放 (Where should I store this medication)?**

- 谨防儿童接触
- 片剂: 在室温 (15° C至30° C) 下储存在密闭容器中。
- 远离热源和直射光。储存在阴凉、干燥处。

**如果我有其他问题, 应该给谁打电话(Where do I call if I have any other questions)?**

您的医生、诊所或公共卫生单位: \_\_\_\_\_

温哥华结核病服务诊所: 604-707-2692

新西敏市结核病服务诊所: 604-707-2698

BC 省疾病控制中心疫苗与药房服务: 604-707-2580