



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

www.bccdc.ca

LEVOFLOXACINA LEVOFLOXACIN

La levofloxacin es un antibiótico que se utiliza para el tratamiento de infecciones bacterianas.

¿Cuándo debo tomarlo? (When should I take this?)

- La levofloxacin puede tomarse con o sin alimentos.
- Tómela con un vaso de agua lleno de 8 oz (=240 ml) a la misma hora todos los días. Esto le ayudará a recordar tomar el medicamento.
- Tome varios vasos de líquidos a lo largo del día.

¿Cómo debo tomarlo? (How should I take this?)

- Es muy importante que tome la levofloxacin exactamente como se lo indique su médico.

¿Qué debo hacer si se me olvida tomar una dosis? (What should I do if I miss a dose?)

- Si se le olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Pero si ya casi es hora de tomar la dosis del siguiente día, omita la dosis que olvidó.
- **No tome una dosis doble.**

¿Hay algo que deba evitar mientras lo tomo? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- La levofloxacin debe tomarse por lo menos **2 horas antes o 2 horas después** de tomar lo siguiente:
 - Antiácidos que contengan aluminio, calcio o magnesio (p. ej., Maalox®, Mylanta®, Roloids®).
 - Sucralfato (medicamento para las úlceras).
 - Complementos que contengan calcio, hierro o zinc.

Antes de tomar **LEVOFLOXACINA**, asegúrese de informar a su médico, enfermera o farmacéuta todos los medicamentos (incluidos aquellos que no requieren de receta) que está tomando. NO empiece a tomar un nuevo medicamento sin consultar a un médico o a un farmacéuta

¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios? (What are some possible side effects?)

- náusea, vómito, diarrea
- dolor de cabeza
- mareo o aturdimiento
- insomnio

LEVOFLOXACINA (continuación) LEVOFLOXACIN (cont'd)

Precaución (Caution): llame a su médico o enfermera de inmediato si presenta los siguientes síntomas:

- sarpullido, urticaria o dificultad para respirar
- ritmo cardíaco irregular o dolor en el tórax
- dolor en los músculos, los tendones o las articulaciones
- dolor, ardor, hormigueo, adormecimiento o debilidad en las manos o los pies
- coloración amarilla en la piel o en la parte blanca de los ojos
- cambios o alteraciones en la vista
- diarrea intensa o con sangre
- cualquier otro efecto secundario persistente

Informe a su médico si presenta algún síntoma inusual que no se haya mencionado en esta hoja informativa.

La levofloxacin puede causar aturdimiento o mareo. Tenga cuidado al manejar, operar maquinaria o realizar actividades peligrosas.

La levofloxacin puede hacer que la piel se queme fácilmente con el sol. Evite la exposición excesiva a la luz solar o a la luz ultravioleta artificial (p. ej., camas de bronceado, lámparas solares). Use un filtro de protección solar o use ropa protectora.

Si tiene diabetes, hágase con regularidad análisis de los niveles de glucosa sanguínea mientras tome este medicamento.

Informe a su médico si está embarazada, si planea quedar embarazada o si desea amamantar a su bebé.

¿Dónde debo almacenar este medicamento? (Where should I store this medication?)

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Comprimidos: almacenar a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C). Proteger de la luz. Almacenar en un lugar fresco y seco.

¿A dónde llamo si tengo alguna otra pregunta? (Where do I call if I have any other questions?)

A su médico, clínica o unidad de salud pública: _____

Clínica de servicios para la TB en Vancouver: 604-707-2692

Clínica de servicios para la TB en New Westminster: 604-707-2698

Servicio de farmacia y vacunas del Centro de Control de Enfermedades de la Colombia Británica (BCCDC): 604-707-2580