



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

www.bccdc.ca

LEVOFLOXACIN LEVOFLOXACIN

Levofloxacin là thuốc trụ sinh dùng để trị các loại nhiễm trùng.

Khi nào tôi nên dùng thuốc này? (When should I take this?)

- Levofloxacin có thể dùng chung với thức ăn hoặc không.
- Dùng thuốc này với một ly nước đầy 8 oz (=240 mL) vào cùng giờ mỗi ngày. Điều này sẽ giúp quý vị nhớ uống thuốc.
- Uống nhiều ly chất lỏng suốt ngày.

Tôi nên dùng thuốc này như thế nào? (How should I take this?)

- Điều hết sức quan trọng là quý vị phải dùng Levofloxacin theo đúng chỉ thị của bác sĩ.

Tôi cần làm gì nếu tôi quên dùng một liều? (What should I do if I miss a dose?)

- Nếu quên dùng một liều, quý vị hãy dùng liều đó ngay khi nhớ ra. Nhưng nếu gần đến giờ của liều thuốc hôm sau, hãy bỏ qua liều lỡ quên này.
- **Đừng dùng hai liều cùng lúc.**

Tôi có nên tránh thứ gì khi dùng thuốc này không? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- Nên dùng Levofloxacin ít nhất **2 giờ trước khi hoặc 2 giờ sau khi** dùng những thuốc sau:
 - thuốc giảm axit (antacids) có chứa chất Nhôm, Canxi và/hoặc Magnesium (ví dụ như Maalox®, Mylanta®, Rolaids®).
 - sucralfate (thuốc trị loét bao tử)
 - vitamins hoặc thuốc bổ có chất Sắt, Kẽm hoặc Canxi

Trước khi dùng **LEVOFLOXACIN**, nhớ cho bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ biết tất cả các loại thuốc quý vị đang dùng (kể cả thuốc không cần toa). **ĐỪNG** bắt đầu dùng một thuốc mới mà không tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Có thể xảy ra một vài tác dụng phụ nào? (What are some possible side effects?)

- buồn nôn, tiêu chảy
- nhức đầu
- buồn ngủ hoặc chóng mặt
- mất ngủ

LEVOFLOXACIN (tiếp theo) LEVOFLOXACIN (cont'd)

Lưu ý (Caution): Hãy gọi ngay lập tức cho bác sĩ hoặc y tá của mình nếu quý vị bị những triệu chứng sau đây:

- phát ban, phong ngứa, hoặc khó thở
- nhịp tim bất thường hoặc đau ngực
- đau cơ bắp, gân, hoặc khớp xương
- đau, rát, lẩn tẩn, tê, yếu bàn tay hoặc bàn chân
- da hoặc lòng trắng mắt bị vàng
- thay đổi hoặc khó chịu thấy được
- tiêu chảy nghiêm trọng hoặc có máu
- bất cứ tác dụng phụ dai dẳng nào khác

Cho bác sĩ biết nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng bất thường nào không được nhắc đến trong tờ thông tin này.

Levofloxacin có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt. Cẩn thận khi lái xe, điều khiển máy móc hoặc làm công việc nguy hiểm.

Levofloxacin có thể khiến cho da dễ bị cháy nắng. Tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng UV nhân tạo quá nhiều (như giường tắm nắng, đèn làm nâu da). Dùng thuốc chống nắng và mặc quần áo bảo vệ.

Nếu quý vị bị tiểu đường, kiểm tra mức đường huyết của quý vị thường xuyên trong khi dùng thuốc này.

Cho bác sĩ biết nếu quý vị đang có thai, dự tính có thai, hoặc nếu quý vị muốn cho con bú sữa mẹ.

Tôi nên cất giữ thuốc này ở đâu? (Where should I store this medication?)

- Để tránh xa tầm với của trẻ em
- Thuốc viên: Cất giữ ở nhiệt độ phòng (15°C đến 30°C). Tránh ánh sáng. Cất giữ ở một nơi khô, mát.

Tôi gọi cho ai nếu tôi có bất cứ thắc mắc nào khác? (Where do I call if I have any other questions?)

Bác sĩ, y viện hoặc Trạm Y Tế Công Cộng của quý vị: _____
Y Viện Kiểm Soát TB Vancouver: 604-707-2692
Y Viện Kiểm Soát TB New Westminster: 604-707-2698
Dịch Vụ Chủng Ngừa và Nhà Thuốc BCCDC: 604-707-2580