



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

LINEZOLID LINEZOLID

El linezolid es un antibiótico que se usa para tratar la tuberculosis (TB) u otras infecciones relacionadas.

¿Cuándo debo tomarlo? (When should I take this?)

- Tome este medicamento a la misma hora todos los días. Esto le ayudará a recordar que debe tomar la medicina.

¿Cómo debo tomarlo? (How should I take this?)

- Tómelo según las indicaciones de su médico.
- Es muy importante que tome este medicamento con regularidad.
- Este medicamento puede tomarse con o sin alimentos.

¿Qué debo hacer si se me olvida tomar una dosis? (What should I do if I miss a dose?)

- Si se le olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Pero si ya casi es hora de tomar la dosis del siguiente día, omita la dosis que olvidó.
- **No tome una dosis doble.**

¿Hay algo que deba evitar mientras lo tomo? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- Evite consumir alimentos o bebidas con un alto contenido de tiramina, como productos maduros, fermentados, encurtidos, ahumados o con levaduras (p. ej., quesos maduros; chucrut; carnes curadas, secadas al aire o procesadas; cubos de consomé; salsa de soja; salsa de pescado; kimchi; sopa miso; cerveza de barril; vino; aguacates; habas; frutas demasiado maduras, o alimentos almacenados incorrectamente o en mal estado).
ACLARACIÓN: esta no es una lista completa; para obtener más información nutricional, comuníquese a HealthLink BC al 8-1-1.
- Evite consumir cualquier preparación para la gripe o el resfriado que contenga descongestionantes, como la pseudoefedrina (p. ej., Advil® Cold and Sinus, Claritin® Allergy + Sinus, NeoCitran® Ultra Strength Total Flu Night).

Informe a su médico, enfermera y farmacéuta **si está tomando cualquier otro medicamento**, lo que incluye productos de venta libre (que no requieren receta) y productos naturales para la salud.

¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios? (What are some possible side effects?)

- Diarrea
- Náusea
- Vómito
- Dolor de cabeza
- Mareo
- Cambios en el sentido del gusto
- Ardor, hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies
- Infección vaginal por hongos, manchas blancas en la boca o decoloración de la lengua

Hable con su médico sobre cualquier efecto secundario que pueda presentar.

→ **Página 2**



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

Precaución: deje de tomar este medicamento y llame a su médico o enfermera de inmediato si presenta los siguientes síntomas:

- Sarpullido, urticaria, picazón, hinchazón, sibilancia, opresión en el pecho, dificultad para respirar
- Aparición de cardenales o sangrado inusuales, sensación de mucho cansancio o debilidad, falta de aliento, fiebre y escalofrío, o dolor de garganta
- Presión arterial extremadamente alta
- Dolor de cabeza intenso
- Cualquier cambio en su visión, lo que incluye cambios en la forma en que ve los colores
- Dolores musculares o calambres inusuales, cansancio o debilidad, sensación de frío, dolor estomacal con o sin vómito, dificultad para respirar o ritmo cardíaco irregular
- Confusión; agitación; inquietud; temblores; fiebre; pulso rápido; rubor; sudoración abundante; mareo o cambios en el equilibrio y la coordinación; cambios en el estado mental/estado de ánimo; molestia estomacal intensa, vómito o diarrea; contracciones musculares; sensibilidad a la luz o convulsiones

Informe a su médico si presenta algún síntoma inusual que no se haya mencionado en esta hoja informativa.

¿Qué más debo saber acerca del consumo de linezolid?

- Es importante que se haga todas las **pruebas de laboratorio que ordene** su médico y que asista a todas sus citas con su proveedor de atención médica.
- Informe a su proveedor de atención médica si está **embarazada**, si planea quedar embarazada o si desea **amamantar** a su bebé.
- Informe a su proveedor de atención médica si tiene antecedentes de convulsiones.

¿Dónde debo almacenar este medicamento? (Where should I store this medication?)

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Proteger de la luz y la humedad.
- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco.

¿A dónde llamo si tengo alguna otra pregunta? (Where do I call if I have any other questions?)

A su médico, clínica o unidad de salud pública: _____
Clínica de servicios para la TB en Vancouver: 604-707-2692
Clínica de servicios para la TB en New Westminster: 604-707-2698
Servicio de farmacia y vacunas de BCCDC: 604-707-2580