



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

www.bccdc.ca

莫西沙星 MOXIFLOXACIN

莫西沙星是一种用于治疗细菌感染（包括结核病）的抗生素。

我该什么时候服用此药 (When should I take this)?

- 莫西沙星可在餐前或餐后服用。
- 用8盎司（= 240毫升）的一整杯水，在每天同一时间服用莫西沙星。这有助于您记得服药。
- 一天当中喝多杯水。
- 整片吞服。不要咬碎或咀嚼药片。

我该如何服用此药 (How should I take this)?

- 严格按医嘱服用莫西沙星非常重要。

如果漏服一次，我该怎么办 (What should I do if I miss a dose)?

- 如果漏服一次，请在想起时尽快服用。但是，如果快到该服第二天的剂量时，则不必补服。
- 请勿服用双倍剂量。

服用此药有无禁忌 (Is there anything I should avoid when taking this)?

- 应在服用以下药物至少**4小时前**或**8小时后**服用莫西沙星：
 - 含铝和/或镁的抗酸剂。(Maalox®、Mylanta®)
 - 硫糖铝（溃疡药）
 - 含铁或锌的补充剂。

在服用莫西沙星前，务必告诉医生、护士或药剂师您正在服用的所有药物（包括非处方药）。在咨询医生或药剂师之前，切勿开始服用新药物。

可能有哪些副作用 (What are some possible side effects)?

副作用并不常见，通常很轻微，可包括：

- 恶心、呕吐、腹泻
- 头痛
- 头晕目眩
- 失眠

莫西沙星 MOXIFLOXACIN (续)

警告 (Caution): 如果您出现以下症状, 请立即致电您的医生或护士:

- 皮疹、荨麻疹或呼吸困难
- 心跳不规则或胸痛
- 肌肉、肌腱或关节疼痛
- 手或脚疼痛、灼痛、刺痛、麻木、无力
- 皮肤或眼白发黄
- 视力改变或障碍
- 血性或水性腹泻
- 任何其他持续的副作用

如果您出现此信息表中未提及的任何异常症状, 请告诉医生。

莫西沙星可导致嗜睡或晕眩。开车、操作机器或进行危险活动时要小心。

莫西沙星可导致皮肤容易晒伤。避免过度接触阳光或人造紫外线(如晒黑床、太阳灯)。使用防晒霜或穿防护服。

糖尿病患者服用此药期间要定期检查血糖水平。

如果您怀孕、计划怀孕或希望用母乳喂养宝宝, 请告诉医生。

这种药物应如何存放 (Where should I store this medication)?

- 谨防儿童接触
- 片剂: 放在凉爽、干燥处, 室温保存。

如果我有其他问题, 应该给谁打电话(Where do I call if I have any other questions)?

您的医生、诊所或公共卫生单位: _____

温哥华结核病服务诊所: 604-707-2692

新西敏市结核病服务诊所: 604-707-2698

BC省疾病控制中心疫苗与药房服务: 604-707-2580