



BC Centre for Disease Control  
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard  
TB Services Fax

604 707 2692  
604 707 2690

www.bccdc.ca

## MOXIFLOXACIN MOXIFLOXACIN

Moxifloxacin là thuốc trụ sinh dùng để trị các loại nhiễm trùng.

### Khi nào tôi nên dùng thuốc này? (When should I take this?)

- Moxifloxacin có thể dùng chung với thức ăn hoặc không.
- Dùng thuốc này với một ly nước đầy 8 oz (=240 mL) vào cùng giờ mỗi ngày. Điều này sẽ giúp quý vị nhớ uống thuốc.
- Uống nhiều ly chất lỏng suốt ngày.
- Nuốt trọn viên thuốc. Đừng nghiền hoặc nhai viên thuốc.

### Tôi nên dùng thuốc này như thế nào? (How should I take this?)

- Điều hết sức quan trọng là quý vị phải dùng moxifloxacin theo đúng chỉ thị của bác sĩ.

### Tôi cần làm gì nếu tôi quên dùng một liều? (What should I do if I miss a dose?)

- Nếu quên dùng một liều, quý vị hãy dùng liều đó ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần đến giờ của liều thuốc hôm sau, hãy bỏ qua liều lỡ quên này.
- **Đừng dùng hai liều cùng lúc.**

### Tôi có nên tránh thứ gì khi dùng thuốc này không? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- Nên dùng Moxifloxacin tối thiểu **4 giờ trước khi hoặc 8 giờ sau khi** dùng những thứ thuốc sau:
  - thuốc giảm axit (antacids) có chứa chất nhôm và/hoặc magnesium (Maalox®, Mylanta®)
  - sucralfate (thuốc trị loét bao tử)
  - thuốc bổ có chứa chất sắt hoặc kẽm

Trước khi dùng **MOXIFLOXACIN**, nhớ cho bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ biết tất cả các loại thuốc quý vị đang dùng (kể cả thuốc không cần toa). **ĐỪNG** bắt đầu dùng một thuốc mới mà không tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

### Có thể xảy ra một vài tác dụng phụ nào? (What are some possible side effects?)

Các tác dụng phụ không xảy ra thường xuyên và thường nhẹ và có thể bao gồm:

- buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy
- nhức đầu
- buồn ngủ hoặc chóng mặt
- mất ngủ

## MOXIFLOXACIN (tiếp theo) MOXIFLOXACIN (cont'd)

**Lưu ý (Caution):** Hãy gọi ngay lập tức cho bác sĩ hoặc y tá của mình nếu quý vị bị những triệu chứng sau đây:

- phát ban, phong ngứa, hoặc khó thở
- nhịp tim bất thường hoặc đau ngực
- đau cơ bắp, gân, hoặc khớp xương
- bàn tay hoặc bàn chân bị đau, nóng, lặn tẩn, tê, yếu
- da hoặc lòng trắng mắt bị vàng
- thay đổi hoặc khó chịu thấy được
- tiêu chảy nghiêm trọng hoặc có máu
- bất cứ tác dụng phụ dai dẳng nào khác

**Cho bác sĩ biết nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng bất thường nào không được nhắc đến trong tờ thông tin này.**

Moxifloxacin có thể gây chóng mặt hoặc choáng váng. Cần thận khi lái xe, điều khiển máy móc hoặc tiến hành hoạt động rủi ro.

Moxifloxacin có thể khiến da dễ bị phỏng nắng. Tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng UV nhân tạo quá nhiều (như giường tắm nắng, đèn làm nâu da). Dùng thuốc chống nắng và mặc quần áo bảo vệ.

Nếu quý vị bị tiểu đường, thường xuyên kiểm tra mức đường huyết của quý vị trong khi dùng thuốc này.

Cho bác sĩ biết nếu quý vị đang có thai, dự tính có thai, hoặc nếu quý vị muốn cho con bú sữa mẹ.

**Tôi nên cất giữ thuốc này ở đâu? (Where should I store this medication?)**

- Để tránh xa tầm với của trẻ em
- Thuốc viên: Cất giữ ở nhiệt độ phòng (15°C đến 30°C). Bảo vệ tránh nhiệt và ánh sáng. Cất giữ ở một nơi khô, mát.

**Tôi gọi cho ai nếu tôi có bất cứ thắc mắc nào khác? (Where do I call if I have any other questions?)**

Bác sĩ, y viện hoặc Trạm Y Tế Công Cộng của quý vị: \_\_\_\_\_

Y Viện Kiểm Soát TB Vancouver:

604-707-2692

Y Viện Kiểm Soát TB New Westminster:

604-707-2698

Dịch Vụ Chứng Ngừa và Nhà Thuốc BCCDC:

604-707-2580