



페이저(PASER®)(파라아미노살리실산 과립) PASER® (p-aminosalicylic acid granules)

PASER는 결핵과 때때로 그 밖의 관련 질환 치료에 사용하는 항생제입니다.

언제 복용해야 하나요? (When should I take this?)

- 소화 불량을 줄이기 위해 음식과 함께 복용하십시오.
- 약을 매일 같은 시간에 복용하십시오. 그러면 약 복용을 기억하는 데 도움이 됩니다.

어떻게 복용해야 하나요? (How should I take this?)

- 규칙적 복용이 매우 중요합니다.
- 과립을 사과 소스나 요구르트 또는 토마토 주스, 오렌지 주스, 포도 주스, 크랜베리 주스, 사과 주스, 과일 펀치 등 과일 음료로 만든 스무디 같은 산성 식품에 뿌리고 씹지 말고 삼키십시오.
- 봉지가 부풀어 있거나 과립이 황갈색이 아니고 암갈색이나 보라색이면 복용하지 마십시오.
- 대변에 과립 껍질이 보일 수도 있습니다.

약 복용을 걸렀으면 어떻게 해야 하나요? (What should I do if I miss a dose?)

- 약 복용을 거르셨으면 생각나는 대로 바로 복용하십시오. 그러나 다음 날 복용 시간이 거의 다 됐으면 그냥 거르십시오.
- 두 배로 복용하지 마십시오.

복용 시 피해야 할 것이 있나요? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- **PASER** 복용 전, 현재 복용 중인 모든 약(비처방약 포함)을 의사나 간호사, 약사에게 반드시 알려주십시오. 새 약은 의사나 약사와 상의 없이 복용을 시작하지 마십시오.

어떤 부작용이 있을 수 있나요? (What are some possible side effects?)

- 구역 및 구토
- 설사, 배앓이

PASER[®](계속) PASER[®] (cont'd)

주의(Caution): 다음 증상이 있으시면 의사나 간호사에게 즉시 연락하십시오.

- 발진
- 발열
- 구역 또는 구토가 지속됨
- 식욕 상실
- 피부 또는 눈 흰자위가 노래짐
- 평소와 달리 피곤하거나 힘이 없음
- 질은 소변
- 기타 모든 지속성 부작용

이 안내지에서 언급하지 않은 비정상적인 증상이 나타나면 담당 의사에게 알려주세요.

PASER를 1개월 넘게 복용하면 비타민 B12 주사를 맞으셔야 할 수도 있습니다. 힘이 없거나 피곤을 느끼면 의사와 상담하십시오.

PASER는 일부 소변 케톤 검사에 방해가 될 수도 있습니다.

임신하셨거나, 임신을 계획하고 있거나, 아기에게 모유 수유를 원하는 분은 의사에게 말씀하십시오.

이 약은 어디에 보관해야 하나요? (Where should I store this medication?)

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (15°C 미만) 냉장고나 냉동고에 보관하십시오.
- 과도한 열을 피하십시오.

기타 궁금한 점이 있으면 어디에 전화하나요? (Where do I call if I have any other questions?)

담당 의사나 클리닉 또는 보건소: _____

밴쿠버 TB 서비스 클리닉: 604-707-2692

뉴웨스트민스터 TB 서비스 클리닉: 604-707-2698

BCCDC 백신 약국 서비스: 604-707-2580