



BC Centre for Disease Control  
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard  
TB Services Fax

604 707 2692  
604 707 2690

www.bccdc.ca

## PASER<sup>®</sup> (对氨基水杨酸颗粒) PASER<sup>®</sup> (p-aminosalicylic acid granules)

对氨基水杨酸颗粒是一种抗生素，用于治疗肺结核，间或用于治疗其他相关疾病。

### 我该什么时候服用此药 (When should I take this)?

- 餐后服用可减轻胃部不适。
- 每天同一时间服用此药。这有助于您记得服药。

### 我该如何服用此药 (How should I take this) ?

- 定时服用此药非常重要。
- 将颗粒洒在酸性食物上，如苹果酱或酸奶，或搅拌在水果饮料中，如番茄汁、橙汁、葡萄汁、蔓越莓汁、苹果汁或混合果汁，吞下颗粒，不要咀嚼。
- 如果包装鼓起，或颗粒失去黄褐色而变成深褐色或紫色，请勿服用。
- 粪便中或可见颗粒空壳。

### 如果漏服一次，我该怎么做 (What should I do if I miss a dose) ?

- 如果漏服一次，请在想起时尽快服用。但是，如果快到该服第二天的剂量时，则不必补服。
- 请勿服用双倍剂量。

### 服用此药有无禁忌 (Is there anything I should avoid when taking this)?

- 在服用**PASER**前，务必告诉医生、护士或药剂师您正在服用的所有药物（包括非处方药）。在咨询医生或药剂师之前，切勿开始服用新药物。

### 可能有哪些副作用 (What are some possible side effects)?

- 恶心和呕吐
- 腹泻
- 胃部不适

## PASER<sup>®</sup> (续) PASER<sup>®</sup> (cont'd)

**警告 (Caution):** 如果您出现以下症状, 请立即致电您的医生或护士:

- 皮疹
- 发烧
- 持续恶心或呕吐
- 食欲不振
- 皮肤或眼白发黄
- 异常疲倦或虚弱
- 尿色黄赤
- 任何其他持续的副作用

如果您出现此信息表中未提及的任何异常症状, 请告诉医生。

如果您服用PASER超过一个月, 可能需要注射维生素B12。如果您感到虚弱或疲倦, 请咨询您的医生。

PASER可能会干扰某些尿酮测试。

如果您怀孕、计划怀孕或希望用母乳喂养宝宝, 请告诉医生。

**这种药物应如何存放 (Where should I store this medication) ?**

- 谨防儿童接触
- 贮存在冰箱或冷冻箱内 (低于15°C)。
- 避免过热

**如果我有其他问题, 应该给谁打电话(Where do I call if I have any other questions) ?**

您的医生、诊所或公共卫生单位: \_\_\_\_\_

温哥华结核病服务诊所: 604-707-2692

新西敏市结核病服务诊所: 604-707-2698

BC省疾病控制中心疫苗与药房服务: 604-707-2580