



PASER®(gránulos de ácido paraaminosalicílico) PASER® (p-aminosalicylic acid granules)

PASER es un agente antibacteriano que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis y, ocasionalmente, de otras afecciones relacionadas.

¿Cuándo debo tomarlo? (When should I take this?)

- Tómelo con alimentos para reducir el malestar estomacal.
- Tome este medicamento a la misma hora todos los días. Esto le ayudará a recordar tomarlo.

¿Cómo debo tomarlo? (How should I take this?)

- Es muy importante que tome este medicamento con regularidad como se lo indique su médico.
- Espolvoree los gránulos sobre alimentos ácidos, como puré de manzana o yogur, y tráguese los gránulos enteros sin masticarlos, o bien, MÉZCLELOS en una bebida de frutas, como jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de arándano, jugo de manzana o ponche de frutas.
- **No los utilice si el paquete está inflado o si los gránulos han perdido su color tostado y están de color café oscuro o morado.**
- Es posible que vea gránulos vacíos en las heces.

¿Qué debo hacer si se me olvida tomar una dosis? (What should I do if I miss a dose?)

- Si se le olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Pero si ya casi es hora de tomar la dosis del siguiente día, omita la dosis que olvidó.
- **No tome una dosis doble.**

¿Hay algo que deba evitar mientras lo tomo? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- Antes de tomar **PASER**, asegúrese de informar a su médico, enfermera o farmacéuta todos los medicamentos (incluidos aquellos que no requieren de receta) que está tomando. NO empiece a tomar un nuevo medicamento sin consultar a un médico o a un farmacéuta.

¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios? (What are some possible side effects?)

- Náusea y vómito
- Diarrea
- Dolor estomacal

PASER[®] (continuación) PASER[®] (cont'd)

Precaución (Caution): llame a su médico o enfermera de inmediato si presenta los siguientes síntomas:

- Sarpullido
- Fiebre
- Náusea o vómito persistentes
- Pérdida del apetito
- Coloración amarilla en la piel o en la parte blanca de los ojos
- Cansancio o debilidad inusuales
- Orina oscura
- Cualquier otro efecto secundario persistente

Informe a su médico si presenta algún síntoma inusual que no se haya mencionado en esta hoja informativa.

Es posible que necesite inyecciones de vitamina B12 si toma PASER durante más de un mes. Consulte a su médico si siente debilidad o cansancio.

PASER podría interferir con algunas **pruebas de cetonas** en orina.

Informe a su médico si está embarazada, si planea quedar embarazada o si desea amamantar a su bebé.

¿Dónde debo almacenar este medicamento? (Where should I store this medication?)

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Almacenar en el **refrigerador** o en el **congelador** (a menos de 15 °C).
- Evitar el almacenaje en calor excesivo.

¿A dónde llamo si tengo alguna otra pregunta? (Where do I call if I have any other questions?)

A su médico, clínica o unidad de salud pública: _____

Clínica de servicios para la TB en Vancouver: 604-707-2692

Clínica de servicios para la TB en New Westminster: 604-707-2698

Servicio de farmacia y vacunas del Centro de Control de Enfermedades de la Colombia Británica (BCCDC): 604-707-2580