



BC Centre for Disease Control  
An agency of the Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard  
TB Services Fax

604 707 2692  
604 707 2690

## 利福布汀 RIFABUTIN

利福布汀(Mycobutin®)是一种用于预防或治疗肺结核及其他相关感染的抗生素。

### 我该什么时候服用此药 (When should I take this)?

- 餐后服用利福布汀或可减轻胃部不适。
- 每天同一时间服用此药。这有助于您记得服药。

### 我该如何服用此药 (How should I take this)?

- 定期服用此药非常重要。
- 按医嘱服用。

### 如果漏服一次，我该怎么做 (What should I do if I miss a dose) ?

- 如果漏服一次，请在想起时尽快服用。但是，如果快到该服第二天的剂量时，则不必补服。
- 请勿服用双倍剂量。

### 服用此药有无禁忌 (Is there anything I should avoid when taking this)?

- 酒精

在服用利福布汀前，务必告诉医生、护士或药剂师您正在服用的所有药物（包括非处方药）。在咨询医生或药剂师之前，切勿开始服用新药物。

### 可能有哪些副作用 (What are some possible side effects)?

- 恶心、呕吐、腹泻、胃部不适及疼痛、胀气、打嗝
- 皮疹
- 头痛
- 味觉改变

## 利福布汀 (续) RIFABUTIN (cont'd)

**警告 (Caution):** 如果您出现以下症状, 请立即致电您的医生或护士:

- 异常疲倦或虚弱
- 发烧和喉咙痛
- 口疮或舌疮
- 视力丧失或眼痛
- 恶心 (想吐)
- 胃部不适或腹泻
- 皮肤或眼白发黄
- 肌肉或关节疼痛
- 皮肤瘀伤
- 皮疹

如果您出现以上未提及的任何异常症状, 请告诉医生。

此药可造成您的眼泪、唾液、汗水、尿液和粪便呈**褐橙色**。这是无害的, 但可能给软性隐形眼镜永久染上颜色。

利福布汀可降低避孕药的功效。请使用另外的避孕方法 (屏障法, 例如避孕套、避孕膜)。停用利福布汀后继续使用屏障法至少**28天**。将口服避孕药的无激素日缩短至**4天**。

务必按医生开出的单子接受所有化验, 并且每次都按预约的时间看医生或护士。

如果您**怀孕**、计划怀孕或希望用母乳喂养宝宝, 请告诉医生。

**这种药物应如何存放 (Where should I store this medication) ?**

- 谨防儿童接触
- 避光
- 胶囊: 贮存在紧闭的容器内, 放在凉爽、干燥处, 室温 (摄氏**15°C**到**30°C**之间) 保存

**如果我有其他问题, 应该给谁打电话 (Where do I call if I have any other questions) ?**

您的医生、诊所或公共卫生单位: \_\_\_\_\_

温哥华结核病服务诊所: 604-707-2692

新西敏市结核病服务诊所: 604-707-2698

BC省疾病控制中心疫苗与药房服务: 604-707-2580