



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

www.bccdc.ca

604 707 2692
604 707 2690

리팜핀 RIFAMPIN

리팜핀은 결핵(TB)과 기타 관련 감염의 예방 및 치료에 사용하는 항생제입니다.

언제 복용해야 하나요? (When should I take this?)

- 공복에 즉, 음식 섭취 1시간 전 또는 2시간 후에 복용하십시오.
- 약을 매일 같은 시간에 복용하십시오. 그러면 약 복용을 기억하는 데 도움이 됩니다.

어떻게 복용해야 하나요? (How should I take this?)

- 규칙적 복용이 매우 중요합니다.
- 의사의 지시대로 복용하십시오.

약 복용을 걸렀으면 어떻게 해야 하나요? (What should I do if I miss a dose?)

- 약 복용을 거르셨으면 생각나는 대로 바로 복용하십시오. 그러나 다음 날 복용 시간이 거의 다 됐으면 그냥 거르십시오.
- 두 배로 복용하지 마십시오.

복용 시 피해야 할 것이 있나요? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- 알코올

리팜핀 복용 전, 현재 복용 중이신 모든 약(비처방약 포함)을 의사나 간호사, 약사에게 반드시 알려주십시오. 새 약은 의사나 약사와 상의 없이 복용을 시작하지 마십시오.

어떤 부작용이 있을 수 있나요? (What are some possible side effects?)

- 메스꺼움, 속쓰림
- 어지럼 또는 두통

주의 (Caution): 다음 증상이 있으시면 의사나 간호사에게 즉시 연락하십시오.

- 평소와 달리 피곤하거나 힘이 없음
- 발열
- 식욕 상실
- 메스꺼움(토하고 싶은 충동)
- 복통 또는 설사
- 짙은 소변
- 피부 또는 눈 흰자위가 노래짐
- 입안이나 혀가 붉
- 피부가 멍둑
- 발진
- 기타 모든 지속성 부작용

Last reviewed by BCCDC Pharmacy June 2019

page 1 of 2

리팜핀(계속) RIFAMPIN (cont'd)

이 안내지에서 언급하지 않은 비정상적인 증상이 나타나면 담당 의사에게 알려주세요.

이 약을 복용하면 눈물, 치아, 침, 가래, 땀, 소변, 대변 등이 붉은 오렌지 색으로 변할 수도 있습니다. 이는 해로운 현상은 아니지만, 콘택트렌즈가 영구 변색되기도 합니다.

리팜핀은 피임제의 효능을 저하시킬 수 있습니다. 다른 피임법(콘돔, 격막 등의 차단법)을 사용하십시오. 리팜핀 복용 중단 후 최소 28일간은 차단법을 계속 사용하십시오. 경구 피임 호르몬제를 복용하지 않는 기간을 4일로 줄이십시오.

의사가 지시한 모든 검사실 검사를 받고 의사나 간호사 방문 예약을 빠짐없이 지키시는 것이 중요합니다.

임신하셨거나, 임신을 계획하고 있거나, 아기에게 모유 수유를 원하는 분은 의사에게 말씀하십시오.

이 약은 어디에 보관해야 하나요? (Where should I store this medication?)

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선이 닿지 않게 하십시오.
- 캡슐: 약병을 단단히 잠가 상온(15°C~30°C)의 선선하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 현탁액: 냉장고에 보관하십시오. 잘 흔든 다음 복용하십시오.

기타 궁금한 점이 있으면 어디에 전화하나요? (Where do I call if I have any other questions?)

담당 의사나 클리닉 또는 보건소: _____

밴쿠버 TB 서비스 클리닉: 604-707-2692

뉴웨스트민스터 TB 서비스 클리닉: 604-707-2698

BCCDC 백신 약국 서비스: 604-707-2580