



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

www.bccdc.ca

604 707 2692
604 707 2690

利福平 RIFAMPIN

利福平是一种用于预防及治疗肺结核和其他相关感染的抗生素。

我该什么时候服用此药 (When should I take this) ?

- 餐前1小时或餐后2小时空腹服用
- 每天同一时间服用此药。这有助于您记得服药。

我该如何服用此药 (How should I take this) ?

- 定时服用此药非常重要。
- 请按医嘱服药。

如果漏服一次, 我该怎么办 (What should I do if I miss a dose) ?

- 如果漏服一次, 请在想起时尽快服用。但是, 如果快到该服第二天的剂量时, 则不必补服。
- 请勿服用双倍剂量。

服用此药有无禁忌 (Is there anything I should avoid when taking this)?

- 酒精

在服用利福平前, 务必告诉医生、护士或药剂师您正在服用的所有药物 (包括非处方药)。在咨询医生或药剂师之前, 切勿开始服用新药物。

可能有哪些副作用 (What are some possible side effects)?

- 恶心、胃灼热
- 头晕或头痛

利福平 (续) RIFAMPIN (cont'd)

警告 (Caution): 如果您出现以下症状, 请立即致电您的医生或护士:

- 异常疲倦或虚弱
- 发烧
- 食欲不振
- 恶心 (想吐)
- 胃痛或腹泻
- 尿色黄赤
- 皮肤或眼白发黄
- 口疮或舌疮
- 皮肤瘀伤
- 皮疹
- 任何其他持续的副作用

如果您出现此信息表中未提及的任何异常症状, 请告诉医生

此药可造成您的眼泪、牙齿、唾液、痰、汗水、尿液和粪便呈**红橙色**。这是无害的, 但可能给软性隐形眼镜永久染上颜色。

利福平可降低避孕药的功效。请使用另外的避孕方法 (屏障法, 例如避孕套、避孕膜)。停用利福平后, 继续使用屏障法至少**28天**。将口服避孕药的无激素日缩短至**4天**。

务必按医生开出的单子接受所有化验, 并且每次都按预约的时间看医生或护士。

如果您**怀孕**、计划怀孕或希望用母乳喂养宝宝, 请告诉医生。

这种药物应如何存放 (Where should I store this medication) ?

- 谨防儿童接触
- 避光
- 胶囊: 贮存在紧闭的容器内, 放在凉爽、干燥处, 室温保存
- 悬浊剂: 冷藏。使用前摇匀

如果我有其他问题, 应该给谁打电话 (Where do I call if I have any other questions) ?

您的医生、诊所或公共卫生单位: _____

温哥华结核病服务诊所: 604-707-2692

新西敏市结核病服务诊所: 604-707-2698

BC省疾病控制中心疫苗与药房服务: 604-707-2580