



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

www.bccdc.ca

STREPTOMYCINE STREPTOMYCIN

La streptomycine est un antibiotique injectable prescrit pour traiter des infections bactériennes, y compris la tuberculose (la TB).

Comment faut-il le prendre? (How should I take this?)

- Ce médicament est administré par injection dans le muscle selon la recommandation de votre médecin. La dose est basée sur l'affection qui vous touche, votre taille, votre poids et votre réponse au traitement.
- Les examens de laboratoire (tels que les analyses sur la fonction rénale ou la concentration de médicament dans le sang) peuvent être effectués afin d'aider à déterminer la dose optimale pour votre affection.

Que faut-il éviter lors de la prise de ce médicament? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- D'autres médicaments ayant un effet sur les reins et l'ouïe peuvent augmenter les risques de lésions rénales ou de perte auditive lorsque combinés avec la streptomycine.
 - Voici quelques exemples : les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}) ou le naproxène et les diurétiques (pilules favorisant l'élimination de l'eau) tels que le furosémide (Lasix^{MD}).
- Les relaxants musculaires ou autres médicaments qui pourraient être source de troubles nerveux.

Si vous **prenez d'autres médicaments**, y compris un médicament en vente libre (obtenu sans ordonnance), parlez-en à votre médecin ou pharmacien(ne).

La streptomycine ne devrait pas être prise en même temps que certains vaccins à base de bactéries vivantes (p. ex. typhoïde et BCG). Informez votre médecin ou pharmacien(ne) si vous devez faire l'objet de **vaccination ou de traitement** prochainement.

Quels sont les effets secondaires potentiels? (What are some possible side effects?)

- nausée, vomissement ou perte d'appétit;
- douleur, irritation ou rougeurs au niveau du site d'injection;
- maux de tête ou vertiges.

Veuillez consulter votre médecin si l'un de ces effets secondaires persiste ou s'aggrave.

STREPTOMYCINE (suite) STREPTOMYCIN (cont'd)

Mise en garde (Caution) : Appelez votre médecin ou infirmier(ère) immédiatement en présence des symptômes suivants :

- réaction allergique (essoufflement, urticaire, gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, éruption cutanée ou évanouissement);
- peu ou pas d'urine;
- diminution de l'ouïe, tintement ou bourdonnement dans les oreilles;
- grondement ou sensation de plénitude dans les oreilles;
- sens de l'équilibre diminué;
- brûlure, picotement ou engourdissement du visage;
- faiblesse musculaire;
- diarrhée liquide sévère ou crampes abdominales.

Avisez votre médecin si vous éprouvez des symptômes inhabituels ne figurant pas dans ce feuillet d'information.

Que faut-il savoir de plus sur la prise de la streptomycine? (What else do I need to know about taking streptomycin?)

- Il est important que vous alliez faire tous les **examens de laboratoire** prescrits par votre médecin et que vous vous rendiez à tous les **rendez-vous** prévus avec votre médecin ou infirmier(ère). Votre médecin peut ordonner des analyses sanguines, des tests auditifs, des tests rénaux ou des tests de niveaux de streptomycine afin de contrôler l'amélioration de vos symptômes ou pour vérifier les effets secondaires.
- Prévenez votre médecin si vous êtes **enceinte**, envisagez une grossesse ou si vous souhaitez **allaier** votre enfant.
- Si vous souffrez de l'un des troubles suivants, veuillez en informer votre médecin : maladies des reins, myasthénie gravis, allergie à la streptomycine ou autres antibiotiques de la famille des aminosides comme l'amikacine, la gentamycine ou la tobramycine.

Qui faut-il appeler si j'ai d'autres questions? (Where do I call if I have any other questions?)

Votre médecin, clinique ou bureau de santé publique : _____
La clinique des services chargés de la tuberculose à Vancouver : 604-707-2692
La clinique des services chargés de la tuberculose à New Westminster : 604-707-2698
Les services de vaccinations et de pharmacie du BCCDC : 604-707-2580