



## 스트렙토마이신 STREPTOMYCIN

스트렙토마이신은 결핵(TB)을 비롯한 세균성 감염 치료에 사용하는 주사 가능한 항생제입니다.

### 어떻게 복용해야 하나요? (How should I take this?)

- 이 약은 의사의 지시에 따라 근육에 주입합니다. 용량은 병태, 몸무게, 치료에 대한 반응을 토대로 정합니다.
- 검사실 검사(콩팥 기능, 혈중 약물 농도 등)는 병태에 대한 최적 용량 산정에 도움이 될 수 있습니다.

### 복용 시 피해야 할 것이 있나요? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- 콩팥이나 청력에 영향을 줄 수 있는 다른 약들을 스트렙토마이신과 같이 복용하면 콩팥 손상이나 청력 상실 위험이 커질 수도 있습니다.
  - 이런 약들의 일반적인 예로는 아이뷰프로펜(Advil®, Motrin®)이나 나프록신(naproxen) 같은 비스테로이드 소염제(NSAIDs)와 푸로시마이드(furosemide)(Lasix®) 같은 이뇨제가 있습니다.
- 신경 문제를 일으킬 수 있는 근육 이완제나 기타 약

비처방 제품을 포함하여 다른 약을 복용 중이시면 의사나 약사에게 알려주십시오.

스트렙토마이신은 특정 생균 백신(예: 장티푸스, BCG)과 함께 사용해서는 안 됩니다. 예방 접종을 받을 계획인 분은 의사나 약사에게 말씀하십시오.

### 어떤 부작용이 있을 수 있나요? (What are some possible side effects?)

- 구역, 구토 또는 식욕 상실
- 주사 부위의 통증, 자극 또는 빨개짐
- 두통, 어지러움

이 중 어느 부작용이든 지속하거나 악화하면 의사와 상담하십시오.

## 스트렙토마이신(계속) STREPTOMYCIN (cont'd)

**주의(Caution):** 다음 증상이 있으시면 의사나 간호사에게 즉시 연락하십시오.

- 알레르기 반응(숨참, 두드러기, 입술이나 얼굴 또는 혀의 부기, 발진, 실신)
- 소변이 줄거나 안 나옴
- 청력 감퇴, 귀의 이명 현상
- 귀에서 들리는 웅웅거리는 소음이나 귀가 막힌 느낌
- 균형감 저하
- 얼굴 화끈거림이나 저림, 무감각
- 근력 저하
- 심한 물 설사 또는 복부 경련

이 안내지에서 언급하지 않은 비정상적인 증상이 나타나면 담당 의사에게 알려주세요.

**스트렙토마이신 복용에 관하여 알아두어야 할 기타 사항은 무엇인가요? (What else do I need to know about taking streptomycin?)**

- 의사가 지시한 모든 **검사실 검사**를 받고 의사나 간호사 방문 **예약**을 빠짐없이 지키시는 것이 중요합니다. 의사는 혈액 검사, 청력 검사, 콩팥 검사, 스트렙토마이신 농도 검사를 통해 경과를 관찰하거나 부작용이 있는지 확인할 수도 있습니다.
- 임신하셨거나, 임신을 계획하고 있거나, 아기에게 **모유 수유**를 원하는 분은 의사에게 말씀하십시오.
- 다음 질환 중 어느 하나라도 있으시면 의사에게 말씀하십시오: 콩팥병, 중증 근육 무력증(myasthenia gravis), 스트렙토마이신 또는 기타 비슷한 아미노글라이코사이드 항생제(아미카신(amikacin), 젠타마이신(gentamicin), 토브라마이신(tobramycin))에 대한 알레르기.

**기타 궁금한 점이 있으면 어디에 전화하나요? (Where do I call if I have any other questions?)**

담당 의사나 클리닉 또는 보건소: \_\_\_\_\_

밴쿠버 TB 서비스 클리닉:	604-707-2692
뉴웨스트민스터 TB 서비스 클리닉:	604-707-2698
BCCDC 백신 약국 서비스:	604-707-2580