



链霉素 STREPTOMYCIN

链霉素是一种用于治疗细菌感染（包括结核病）的可注射用抗生素。

我该如何用药 (How should I take this) ?

- 按医嘱通过肌肉注射给药。剂量根据您的身体状况、体重和对治疗的反应而定。
- 可以通过化验（如肾功能、血液中的药物水平）帮助决定适合您情况的最佳剂量。

使用此药有无禁忌 (Is there anything I should avoid when taking this) ?

- 其他可影响肾脏或听力的药物如果与链霉素一起使用，可能会增加肾脏损伤或丧失听力的风险。
 - 一些常见的例子是布洛芬（Advil®、Motrin®）或萘普生等非甾体抗炎药（NSAIDs），以及呋塞米（Lasix®）等利尿剂（水丸）。
- 肌肉松弛剂或其他可导致神经问题的药物

如果您正在服用**任何其他药品**，包括任何非处方产品，请告诉医生和药剂师。

链霉素不应与某些活细菌疫苗（如伤寒、卡介苗）一起使用。如果您打算接受任何**疫苗接种或治疗**，请告诉您的医生或药剂师。

可能有哪些副作用 (What are some possible side effects) ?

- 恶心、呕吐或丧失食欲
- 注射部位疼痛、发红
- 头痛、头晕

如果任何这些副作用持续或加剧，请咨询您的医生。

链霉素 (续) STREPTOMYCIN (cont'd)

警告 (Caution) : 如果您出现以下症状, 请立即致电您的医生或护士 :

- 过敏反应 (呼吸短促, 荨麻疹, 嘴唇、面部或舌头肿胀, 皮疹或晕厥)
- 少尿或无尿
- 听力下降、耳鸣或耳内嗡嗡作响
- 耳内轰鸣声或耳内胀满感
- 平衡感减弱
- 面部有烧灼、刺痛或麻木感
- 肌肉无力
- 严重水样腹泻或腹部绞痛

如果您出现此信息表中未提及的任何异常症状, 请告诉医生。

关于使用链霉素我还需要知道什么 (What else do I need to know about taking streptomycin) ?

- 您务必按医生开出的单子接受所有化验, 并且每次都按预约的时间看医生或护士。您的医生可能会开出验血单、听力测试单、或链霉素水平检测单来监测您的进展或检查副作用。
- 如果您怀孕、计划怀孕或希望用母乳喂养宝宝, 请告诉医生。
- 如果您有以下任何病情, 请告诉医生: 肾脏疾病、重症肌无力或对链霉素或其他类似的氨基糖苷类抗生素 (如阿米卡星、庆大霉素或妥布霉素) 过敏。

如果我有其他问题, 应该给谁打电话 (Where do I call if I have any other questions) ?

您的医生、诊所或公共卫生单位: _____

温哥华结核病服务诊所: 604-707-2692

新西敏市结核病服务诊所: 604-707-2698

BC省疾病控制中心疫苗与药房服务: 604-707-2580