



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

www.bccdc.ca

ESTREPTOMICINA STREPTOMYCIN

La estreptomycin es un antibiótico inyectable que se utiliza en el tratamiento de infecciones bacterianas, incluida la tuberculosis (TB).

¿Cómo debo administrarlo? (How should I take this?)

- Este medicamento se administra mediante una inyección muscular, según las indicaciones de su médico. La dosis se basa en su afección médica, peso y respuesta al tratamiento.
- Podrían realizarse análisis de laboratorio (como la función renal, los niveles de fármaco en la sangre) para ayudar a determinar la mejor dosis para su afección.

¿Hay algo que deba evitar mientras lo administro? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- Otros medicamentos que pudieran afectar los riñones o el oído podrían aumentar el riesgo de daño renal o pérdida auditiva si se toman en conjunto con la estreptomycin.
 - Algunos ejemplos comunes son los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el ibuprofeno (Advil®, Motrin®) o el naproxeno, así como los diuréticos (“píldoras de agua”), como la furosemida (Lasix®).
- Relajantes musculares u otros medicamentos que puedan causar problemas en los nervios.

Informe a su médico o farmacéuta si está tomando **cualquier otro medicamento**, incluidos todos los productos de venta libre (que no requieren receta).

La estreptomycin no debe usarse en conjunto con ciertas vacunas bacterianas vivas (p. ej., tifoidea, BCG). Hable con su médico o farmacéuta si ha recibido recientemente o está planeando recibir alguna **vacuna o tratamiento**.

¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios? (What are some possible side effects?)

- Náusea, vómito o pérdida del apetito.
- Dolor, irritación o enrojecimiento en el lugar de la inyección.
- Dolor de cabeza, mareo.

Si alguno de estos efectos persiste o empeora, consulte a su médico.

ESTREPTOMICINA (continuación) STREPTOMYCIN (cont'd)

Precaución (Caution): llame a su médico o enfermera de inmediato si presenta los siguientes síntomas:

- una reacción alérgica (falta de aliento, urticaria, hinchazón de los labios, el rostro o la lengua, sarpullido o desmayo)
- poca orina o falta de orina
- menor capacidad para oír, silbido o zumbido en los oídos
- ruidos estruendosos en los oídos o sensación de llenura en los oídos
- disminución del sentido del equilibrio
- ardor, hormigueo o adormecimiento en el rostro
- debilidad muscular
- diarrea aguada intensa o retortijones abdominales

Informe a su médico si presenta algún síntoma inusual que no se haya mencionado en esta hoja informativa.

¿Qué más necesito saber acerca de la administración de estreptomicina? (What else do I need to know about taking streptomycin?)

- Es importante que se realice todas las **pruebas de laboratorio** que ordene su médico y que asista a todas las **citas** con su médico o enfermera. Es posible que su médico ordene análisis de sangre, pruebas de audición o pruebas de los niveles de estreptomicina para vigilar su evolución y detectar efectos secundarios.
- Informe a su médico si está **embarazada**, si planea quedar embarazada o si desea **amamantar** a su bebé.
- Informe a su médico si tiene alguna de estas afecciones médicas: enfermedad renal, miastenia gravis o alguna alergia a la estreptomicina o a otros antibióticos aminoglucósidos similares, como la amikacina, la gentamicina o la tobramicina.

¿A dónde llamo si tengo alguna otra pregunta? (Where do I call if I have any other questions?)

A su médico, clínica o unidad de salud pública: _____
Clínica de servicios para la TB en Vancouver: 604-707-2692
Clínica de servicios para la TB en New Westminster: 604-707-2698
Servicio de farmacia y vacunas del Centro de Control de Enfermedades de la Colombia Británica (BCCDC): 604-707-2580