



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

ਰੇਫਾਪੈਨਟੀਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਨਿਆਜ਼ਿਡ RIFAPENTINE and ISONIAZID

ਰੇਫਾਪੈਨਟੀਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਨਿਆਜ਼ਿਡ ਦੋ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਪਦਿਕ (ਟੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਗੁਪਤ (ਸਿਥਲ ਜਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ) ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? (How should I take this?)

- ਰੇਫਾਪੈਨਟੀਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਨਿਆਜ਼ਿਡ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਕੁੱਲ 12 ਮੁਰਾਕਾਂ)।
- ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ “ਡੇਲੀ ਉਬਜ਼ਰਵਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਟੇਟਿਵ ਥੈਰੇਪੀ” (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.ਟੀ.) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਨੈਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਹ ਅਤੇ ਟੋਸਟ) ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਰਾਕ, ਅਪੈਂਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫੇਰੀ ਖੁੰਝਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (What should I do if I miss a dose, appointment, or visit?)

- ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਕਾਂ ਖੁੰਝਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਭੁੱਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਖੁੰਝ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀ.ਬੀ. ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਮੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਐਂਟਾਸਿਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੂਮਨਮ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਨਿਆਜ਼ਿਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਲਈ।

ਰੇਫਾਪੈਨਟੀਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਨਿਆਜ਼ਿਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)। ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? (What are some possible side effects of this treatment?)

- ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ (ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਫਲੂ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਧੱਢੜ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ)
- ਧੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਦਸਤ ਲੱਗਣੇ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ)
- ਅਸਾਧਾਰਣ ਬਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ (ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਰੰਗ)
- ਰਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਫੇਦ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੀਲਾਪਣ
- ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਝਣਕਣੀ, ਸੁੰਨਤਾ ਹੋਣੀ

- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਣ ਹੰਡੂ, ਬੁੱਕ, ਬਲਗਮ, ਪਸੀਨੇ, ਟੱਟੀ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਢੁੱਧ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ-ਸੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੌਫ਼ਟ ਕੌਨਟੈਕਟ ਲੈਨਸ ਅਤੇ ਡੈਂਚਰਾਂ ਉਪਰ ਪੱਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀ.ਬੀ. ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਚੱਸੋ।

ਮੈਨੂੰ ਰੇਫਾਪੈਨਟੀਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਨਿਆਜ਼ਿਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (What else do I need to know about taking rifapentine and isoniazid?)

- ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੈਂਟੈਂਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਗਰਭ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਚੱਸੋ।
- ਰੇਫਾਪੈਨਟੀਨ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ (ਅਤਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਡੇਮ/ਡਾਇਆਫਰਾਮ)। ਰੇਫਾਪੈਨਟੀਨ ਲੈਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਕ ਅਤਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ-ਰਹਿਤ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਕੈਲੋਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨ ਕਰੋ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਝੁਣਝੁਣੀ ਜਾਂ ਸੁੰਨਤਾ ਦੀ ਰੋਕਖਾਮ ਲਈ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੀਡੋਕਸਿਨ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6) ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਛੋਨ ਕਰਾਂ? (Where do I call if I have any other questions?)

ਟੀ.ਬੀ. ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: _____

ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੀ.ਬੀ. ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਲੀਨਿਕ: 604-707-2692

ਨਿਊ ਵੈਸਰਿੰਸਟਰ ਟੀ.ਬੀ. ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਲੀਨਿਕ: 604-707-2698

ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼: 604-707-2580