



BC Centre for Disease Control  
An agency of the Provincial Health Services Authority

## LINÉZOLIDE LINEZOLID

Le linézolide est un antibiotique prescrit pour traiter la tuberculose (la TB) et d'autres infections connexes.

### Quand faut-il en prendre? (When should I take this?)

- Prenez ce médicament tous les jours à la même heure. Ceci vous permettra de ne pas l'oublier.

### Comment faut-il le prendre? (How should I take this?)

- Suivez la posologie recommandée par votre médecin.
- Il est très important que vous preniez ce médicament régulièrement.
- Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.

### Que faire si je manque une dose? (What should I do if I miss a dose?)

- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Toutefois, s'il est presque l'heure de prendre la dose du lendemain, sautez la dose manquée.
- **Ne prenez pas une double dose.**

### Que faut-il éviter lors de la prise de ce médicament? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- Évitez les aliments et les boissons avec un contenu élevé de tyramine tels que les produits affinés, fermentés, marinés, fumés ou avec de la levure (c.-à-d. les fromages affinés; la choucroute; les viandes salées, séchées à l'air ou préparées; les cubes de bouillon; la sauce de soja, la sauce de poisson; le kimchi; la soupe miso; les bières pression; le vin; les avocats; les fèves; les fruits trop mûrs; ou les aliments non conservés correctement ou avariés).  
**REMARQUE : Cette liste n'est pas complète; pour des informations alimentaires supplémentaires, communiquez avec HealthLink BC en composant le 8-1-1.**
- Évitez de prendre des préparations contre le rhume ou la grippe contenant des décongestionnants tels que la pseudoéphédrine (c.-à-d. Advil<sup>MD</sup> pour le rhume et les sinus, Claritin<sup>MD</sup> pour les allergies et les sinus, NeoCitran<sup>MD</sup> très fort pour la nuit en cas de grippe).

Si vous **prenez d'autres médicaments**, y compris un médicament en vente libre (obtenu sans ordonnance) et des produits naturels diététiques, parlez-en à votre médecin, infirmière ou pharmacien.

### Quels sont les effets secondaires potentiels? (What are some possible side effects?)

- Diarrhée
- Nausées
- Vomissements
- Maux de tête
- Vertiges
- Changements de goût
- Brûlures, des fourmillements ou des engourdissements dans les mains ou les pieds
- Infection vaginale aux levures, taches blanches dans la bouche ou une décoloration de la langue

**Parlez des effets secondaires que vous avez rencontrés avec votre médecin.**

→ Page 2



BC Centre for Disease Control  
An agency of the Provincial Health Services Authority

**Mise en garde : Arrêtez immédiatement la prise de ce médicament et appelez votre médecin ou infirmière en présence des symptômes suivants :**

- éruption cutanée, urticaire, démangeaisons, enflure, respiration sifflante, oppression thoracique, difficultés à respirer;
- saignement inhabituel ou ecchymoses de la peau, faiblesse ou fatigue intense, respiration courte, fièvre et frisson ou mal de gorge;
- hypertension (pression artérielle élevée);
- maux de tête sévères;
- tout changement de votre vision, y compris des changements de la vision des couleurs;
- douleurs musculaires inhabituelles ou crampes, fatigue ou faiblesse, sensations de froid, douleurs à l'estomac avec ou sans vomissements, difficultés à respirer, ou fréquence cardiaque irrégulière;
- confusion, agitation, nervosité, tremblement, fièvre, battements de cœur rapides, rougeurs, transpiration élevée, vertiges ou changement de l'équilibre et de la coordination, changement d'état mental ou d'humeur, graves maux d'estomac, vomissements ou diarrhée, secousses musculaires, sensibilité à la lumière, ou attaques.

**Avisez votre médecin si vous éprouvez des symptômes inhabituels ne figurant pas dans ce feuillet d'information.**

**Que faut-il savoir de plus sur la prise du linézolide? (What else do I need to know about taking Linezolid?)**

- Il est important que vous alliez faire tous les **examens de laboratoire** prescrits par votre médecin et que vous vous rendiez à tous les rendez-vous prévus avec votre fournisseur de soins de santé.
- Prévenez votre fournisseur de soins de santé si vous êtes **enceinte**, envisagez une grossesse ou si vous souhaitez **allaitez** votre enfant.
- Si vous avez des antécédents d'attaques, informez-en votre fournisseur de soins de santé.

**Où faut-il conserver ce médicament? (Where should I store this medication?)**

- Ne le laissez pas à la portée des enfants.
- Protégez-le de la lumière et de l'humidité.
- Conservez-le à température ambiante dans un endroit frais et sec.

**Qui faut-il appeler si j'ai d'autres questions? (Where do I call if I have any other questions?)**

Votre médecin, clinique ou bureau de santé publique : \_\_\_\_\_

La clinique des services chargés de la tuberculose à Vancouver : 604-707-2692

La clinique des services chargés de la tuberculose à New Westminster : 604-707-2698

Les services de vaccinations et de pharmacie du BCCDC : 604-707-2580