



리네졸리드 LINEZOLID

리네졸리드는 결핵(TB)이나 기타 관련 감염 치료에 사용하는 항생제입니다.

언제 복용해야 하나요? (When should I take this?)

- 이 약은 매일 같은 시간에 복용하십시오. 그러면 약 복용을 기억하는 데 도움이 됩니다.

어떻게 복용해야 하나요? (How should I take this?)

- 의사의 지시대로 복용하십시오.
- 이 약은 규칙적으로 복용하시는 것이 매우 중요합니다.
- 이 약은 음식과 함께 또는 공복에 복용하셔도 됩니다.

복용을 1회 잊으시면 어떻게 해야 하나요? (What should I do if I miss a dose?)

- 복용을 1회 잊으시면 기억나는 대로 바로 복용하십시오. 그러나 다음 날 복용 시간이 거의 다 되었다면 놓치신 용량을 건너뛰십시오.
- 두 배로 복용하지 마십시오.

복용 시 피해야 하는 것이 있나요? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- 숙성, 발효, 염장, 훈제, 효모 제품(예: 숙성 치즈, 사우어크라우트, 절이거나 공기로 말리거나 가공한 육류, 고형 부용, 간장, 생선 소스, 김치, 된장국, 생맥주, 와인, 아보카도, 파바 콩, 농익은 과일, 부적절하게 저장되거나 상한 식품) 같이 티라민(tyramine) 함량이 높은 식품이나 음료는 피하십시오.
주: 이것은 완전한 목록이 아닙니다. 음식물에 관한 추가 정보는 contact HealthLink BC에 8-1-1로 문의하십시오.
- 슈도에 페드린(pseudoephedrine)(예: Advil® Cold and Sinus, Claritin® Allergy + Sinus, NeoCitran® Ultra Strength Total Flu Night) 같은 충혈 제거제가 함유된 감기 약제나 독감 약제를 복용하지 마십시오.

처방전 없이 살 수 있는(비처방) 제품과 천연 건강 제품을 포함하여 다른 약을 복용하고 계시면 담당 의사나 간호사, 약사에게 알려주십시오.

어떤 부작용이 있을 수 있나요? (What are some possible side effects?)

- 설사
- 메스꺼움
- 구토
- 두통
- 현기증
- 미각의 변화
- 손이나 발의 화끈거림, 저림 또는 무감각증
- 질 효모 감염이나 입 안의 백태, 혀의 변색

무슨 부작용이든 나타나면 담당 의사에게 말씀하십시오.

➔ 2 페이지로



주의 사항: 다음 증상이 나타나면 이 약 복용을 중단하고 의사나 간호사에게 즉시 연락하십시오.

- 발진, 두드러기, 가려움, 부기, 썩썩거림, 가슴이 답답함, 호흡 곤란
- 이례적인 출혈이나 멍듦, 매우 고단하거나 힘이 없는 느낌, 숨참, 열과 오한, 목아픔
- 심한 고혈압
- 심한 두통
- 색깔의 변화를 포함한 시력의 모든 변화
- 이례적인 근육통이나 근육 경련, 피로나 허약, 추위를 느낌, 구토를 동반하거나 동반하지 않는 복통, 호흡 곤란, 불규칙한 심장 박동
- 혼돈, 초조, 안절부절, 떨림, 열, 잦은맥박, 홍조, 땀 과다증, 현기증, 몸의 균형과 손발 협조 기능의 변화, 정신/기분 상태의 변화, 심한 배앓이, 구토, 설사, 근육 쥘룩임, 광민감성, 발작

이 안내지에서 언급하지 않은 이례적인 증상이 나타나면 담당 의사에게 말씀하십시오.

리네졸리드 복용에 관하여 달리 알아두어야 할 사항은 무엇인가요? (What else do I need to know about taking Linezolid?)

- 담당 의사가 지시한 모든 **검사실 검사**를 받고 의료 제공자와의 예약 진료에 모두 가시는 것이 중요합니다.
- **임신** 중이거나, 임신 계획이 있거나, 아기에게 **모유 수유**를 원하시면 담당 의료 제공자에게 말씀하십시오.
- 발작 병력이 있으시면 담당 의료 제공자에게 알려주십시오.

이 약은 어디에 보관해야 하나요? (Where should I store this medication?)

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 햇빛과 습기로부터 보호하십시오.
- 시원하고 건조한 곳에서 실온에 보관하십시오.

기타 궁금한 것이 있으면 어디로 전화하나요? (Where do I call if I have any other questions?)

담당 의사나 클리닉 또는 보건소: _____

밴쿠버 결핵(TB) 서비스 클리닉: 604-707-2692

뉴웨스트민스터 결핵(TB) 서비스 클리닉: 604-707-2698

BCCDC 백신 및 약국 서비스: 604-707-2580