

ਲਿਨੇਜ਼ਾਲਿਡ LINEZOLID

ਲਿਨੇਜ਼ਾਲਿਡ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਈਟਿਕ ਹੈ ਜੋ ਤਬਦਿਕ (ਟੀ.ਬੀ.) ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂ? (When should I take this?)

- ਇਹ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ? (How should I take this?)

- ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਵਾਂ।
- ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲਵੇ।
- ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? (What should I do if I miss a dose?)

- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
- ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਲਵੇ।

ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- ਐਸੇ ਖਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਰਾਮਾਈਨ (tyramine) ਤੱਤ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ/ਬਸੀਰੇ, ਫਰਮੈਟਿਡ, ਅਚਾਰ ਬਣਾਏ, ਧੂਆਂਖੇ ਜਾਂ ਯੀਸਟ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਈਰਕਰਾਟ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ, ਸੁਕਾਏ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੀਟ, ਬਾਊਲਨ ਕਿਊਬ, ਸੋਆ ਸਾਸ, ਫਿਸ਼ ਸਾਸ, ਕਿਮਚੀ (kimchi); ਮਿਸੋ ਸੂਪ (miso soup), ਟੈਪ ਬੀਅਰ (tap beers), ਵਾਈਨ, ਐਵਾਕਾਡੋ, ਫਾਵਾ ਬੀਨਜ਼ (fava beans), ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਫਲ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਖਾਣੇ)।
ਨੋਟ: ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਥ ਲਿੰਕ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 8-1-1 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਠੰਡ ਜਾਂ ਛਲੂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਡੋਫਿਡਰਾਈਨ (pseudoephedrine) (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਐਡਵਿਲ (Advil®) ਕੋਲਡ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ, ਕਲੈਰੀਟਿਨ (Claritin®) ਐਲਰਜੀ+ਸਾਈਨਸ, ਨਿਊਸਿਟਰਾਨ (NeoCitran®) ਅਲਟ੍ਰਾਸਟ੍ਰੈਂਚ ਟੋਟਲ ਫਲ ਨਾਈਟ) ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਅਤੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੰਭਵ ਦੁਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? (What are some possible side effects?)

- ਦਸਤ
- ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ
- ਉਲਟੀਆਂ
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
- ਸਵਾਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ
- ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲਨ, ਝੁਣਝੁਣੀ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
- ਯੋਨੀ ਵਿਚ ਯੀਸਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਸਫੇਦ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਜੀਭ ਦਾ ਰੰਗ ਵਿੱਕਾ ਪੈਣਾ।

ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

➔ ਪੰਨਾ 2

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਛੋਨ ਕਰੋ: (Caution: Stop taking this medicine and call your doctor or nurse immediately if you experience the following symptoms)

- ਰੈਸ਼, ਛਥਪਾਕੀ, ਖਾਰਸ਼, ਸੋਜਸ਼, ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ, ਡਾਤੀ ਵਿਚ ਘੁਟਨ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ਼
- ਅਸਾਧਾਰਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲਨਾ ਜਾਂ ਦਾਗ ਪੈਣੇ, ਬਹੁਤ ਬਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ, ਜਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ
- ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਣਾ
- ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਿਰ ਪੀੜ
- ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ ਪੈਣੇ, ਬਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ
- ਪ੍ਰੈਸਾਨੀ; ਘਬਰਾਹਟ; ਬੇਚੈਨੀ; ਕੰਬਣਾ; ਬੁਖਾਰ; ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ, ਫਲੱਸਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਜਾਂ ਬਿੜਕਦੇ ਹੋ, ਡੱਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ; ਦਿਮਾਗੀ/ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ; ਪੇਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ, ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਣਭੁਣੀ ਜਿਹੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਾਂ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਲਿਨੇਜ਼ੂਲਿਡ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (What else do I need to know about taking Linezolid?)

- ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪੂਆਂਇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ।
- ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
- ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਮੈਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂ? (Where should I store this medication?)

- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੱਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
- ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਲ੍ਹੇ/ਨਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
- ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੋਨ ਕਰਾਂ? (Where do I call if I have any other questions?)

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ:

ਵੈਨਕੁਵਰ ਟੀ.ਬੀ. ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਲੀਨਿਕ: 604-707-2692

ਨਿਊ ਵੈਂਸਟਮਿਨਸਟਰ ਟੀ.ਬੀ. ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਲੀਨਿਕ: 604-707-2698

ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਡਾਰਮੇਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼: 604-707-2580