



RIFAMPICINE RIFAMPIN

La rifampicine est un antibiotique prescrit pour prévenir ou traiter la tuberculose (la TB) et d'autres infections similaires.

Quand faut-il en prendre? (When should I take this?)

- Prenez la dose à jeun, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.
- Prenez ce médicament tous les jours à la même heure. Ceci vous permettra de ne pas l'oublier.

Comment faut-il le prendre? (How should I take this?)

- Il est très important que vous preniez ce médicament régulièrement.
- Suivez la posologie recommandée par votre médecin.

Que faire si je manque une dose? (What should I do if I miss a dose?)

- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Toutefois, s'il est presque l'heure de prendre la dose du lendemain, sautez la dose manquée.
- **Ne prenez pas une double dose.**

Que faut-il éviter lors de la prise de ce médicament? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- l'alcool.

Avant de prendre de la **RIFAMPICINE**, veuillez informer votre médecin, infirmier(ère) ou pharmacien(ne) de tous les médicaments que vous prenez (y compris les médicaments en vente libre). **NE** prenez **PAS** un nouveau médicament sans avoir consulté votre médecin ou pharmacien(ne).

Quels sont les effets secondaires potentiels? (What are some possible side effects?)

- nausée, brûlures d'estomac;
- vertiges ou maux de tête.

Mise en garde (Caution) : Appelez votre médecin ou infirmier(ère) immédiatement en présence des symptômes suivants :

- fatigue ou faiblesse inhabituelle;
- fièvre;
- perte d'appétit;
- nausée (envie de vomir);
- douleur au ventre ou diarrhée;
- urines foncées;
- peau ou blanc des yeux jaunâtres;

RIFAMPICINE (suite) RIFAMPIN (cont'd)

- bouche ou langue endolories;
- ecchymose de la peau;
- éruption cutanée; ou
- tout autre effet secondaire persistant.

Avisez votre médecin si vous éprouvez des symptômes inhabituels ne figurant pas dans ce feuillet d'information.

Ce médicament peut changer la composition des larmes, des dents, de la salive, du crachat, de la transpiration, de l'urine et des selles et changer leur **coloration allant de teintes rouges à orangées**. Cette réaction est bénigne mais pourrait tacher de façon permanente les lentilles cornéennes souples.

La rifampicine peut diminuer l'efficacité des contraceptifs oraux. Utilisez une autre méthode contraceptive (méthode de barrière comme les préservatifs et les diaphragmes). Continuez à utiliser la méthode de barrière pendant au moins 28 jours après l'interruption de la rifampicine. Réduisez l'intervalle de jours sans contraceptifs oraux à base d'hormones à 4 jours.

Il est important que vous alliez faire tous les examens de laboratoire prescrits par votre médecin et que vous vous rendiez à tous les rendez-vous prévus avec votre médecin ou infirmier(ère).

Prévenez votre médecin si vous êtes **enceinte**, envisagez une grossesse ou si vous souhaitez **allaier** votre enfant.

Où faut-il conserver ce médicament? (Where should I store this medication?)

- Ne le laissez pas à la portée des enfants.
- Protégez-le de la lumière.
- Sous forme de capsule : conservez-le à température ambiante (entre 15 et 30 °C) dans un récipient hermétique et dans un endroit frais et sec.
- Sous forme de suspension : réfrigérez-le. Agitez-le bien avant l'emploi.

Qui faut-il appeler si j'ai d'autres questions? (Where do I call if I have any other questions?)

Votre médecin, clinique ou bureau de santé publique : _____

La clinique des services chargés de la tuberculose à Vancouver : 604-707-2692

La clinique des services chargés de la tuberculose à New Westminster : 604-707-2698

Les services de vaccinations et de pharmacie du BCCDC : 604-707-2580