

# 苜星青霉素（Lentocilin S 1200）

## 治疗梅毒

### Benzathine Benzylpenicillin (Lentocilin S 1200)

#### For Treatment of Syphilis

苜星青霉素（Benzathine Benzylpenicillin）又称苜星青霉素 G。一剂苜星青霉素配制后，分两次注射，分别注射于两侧臀部/髖部，通常足以治疗传染性梅毒。但是，如果感染已持续一年以上，或持续时间不明，则需要注射三剂苜星青霉素（苜星青霉素 G）；这三剂需每周注射一剂，持续三周。建议医护人员咨询 BC 省疾病控制中心（BCCDC）的梅毒专科医生，以确认梅毒分期/诊断和推荐的治疗方案。

### 过敏（Allergies）

- 如果您对青霉素或头孢菌素过敏，请告知医护人员：
  - 如青霉素 V 钾和阿莫西林（Amoxil®）
  - 如头孢西丁
- 如果您对大豆、含大豆产品（如豆腐、豆浆、酱油、照烧酱、伍斯特沙司、黄豆）或花生过敏，请告知医护人员。Lentocilin S 1200 含有大豆磷脂，可能会引发对大豆或花生严重过敏者的过敏反应。
- 如果您对利多卡因（局部麻醉剂）过敏，或有心血管、肝脏或肾脏功能障碍史，请告知医护人员。

### 怀孕/哺乳（Pregnancy and Chest/Breastfeeding）

- 在给怀孕者或哺乳者使用 Lentocilin S 之前，务请咨询 BCCDC 性传播感染科医生。

### 警告（Caution）

- **药物相互作用：** 请注意，本文件未列出个别药物的相互作用。如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣性药物产品，请与医护人员讨论。

## 治疗后的自我护理 (Care of Yourself After Treatment)

- 注射 Lentocilin S 之后，您要在诊所等候 15 分钟。
- 如果治疗后有任何反应（如皮疹、瘙痒或呼吸困难），请立即告知工作人员。
- 如果在离开诊所后出现这些症状，请立即紧急求医（拨打 9-1-1 或前往医院或紧急医疗中心）。

## 副作用 (Side Effects)

- 注射部位可能会有轻微的暂时性疼痛。
- 治疗后可能会出现腹泻。
- 有些人可能会出现雅里什-赫克斯海默 (Jarisch-Herxheimer) 反应：发烧、发冷、肌肉酸痛、头痛或疲劳。
  - 雅里什-赫克斯海默反应是梅毒治疗后几小时内可能出现的一系列暂时性副作用。并非所有人都会有这种反应。
  - 不必惊慌，这不是过敏反应，通常会在 24 小时内消失。
  - 如果需要缓解症状，可服用对乙酰氨基酚（泰诺®）或布洛芬（Advil®）。
- 如果这些副作用没有消失或恶化，请联系医护人员。

## 梅毒的分期 (Stages of Syphilis)

- 对治疗和后续随访的建议取决于梅毒感染在您体内存在的时间长短。医护人员将告知您所处的梅毒分期阶段以及需要采取的治疗方案。您可能还会接到公共卫生部门护士的电话，讨论伴侣的后续随访以及对后续检测的建议。

如果您有任何疑问或需要更多信息，请访问 [www.smartsexresource.com](http://www.smartsexresource.com) 或联系医护人员。

SmartSex 资源：梅毒

