

Bencilpenicilina benzatínica (Lentocilin S 1200)

para el tratamiento de la sífilis

Benzathine Benzylpenicillin (Lentocilin S 1200)

For Treatment of Syphilis

La bencilpenicilina benzatínica también es conocida como penicilina G benzatínica. Se prepara una dosis de bencilpenicilina benzatínica y se administra por medio de dos inyecciones en las áreas de la cadera/los glúteos; esta dosis es, generalmente, adecuada para el tratamiento de la sífilis infecciosa. Sin embargo, si la infección ha estado presente durante más de un año, o durante un periodo de tiempo desconocido, entonces se necesitan tres dosis de bencilpenicilina benzatínica (penicilina G benzatínica); estas inyecciones se administran una vez a la semana en un plazo de tres semanas. Se alienta a los proveedores de atención médica a que consulten a los médicos especialistas en sífilis del BCCDC para confirmar la estadificación/el diagnóstico de la sífilis y el tratamiento recomendado.

Alergias (Allergies)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alergia a las penicilinas o a las cefalosporinas:
 - por ejemplo, penicilina V-K y amoxicilina (Amoxil®)
 - por ejemplo, cefoxitina
- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alergia a la soya, a los productos que contienen soya (por ejemplo, el tofu, la leche de soya, la salsa de soya, la salsa teriyaki, la salsa Worcestershire, las semillas de soya) o a los cacahuates. Lentocilin S 1200 contiene fosfolípidos de soya que podrían causar una reacción alérgica en personas con alergias fuertes a la soya o a los cacahuates.
- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alergia a la lidocaína (un anestésico local) o si tiene un historial de disfunción cardiovascular, hepática o renal.

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- Consulte a los médicos especialistas en infecciones de transmisión sexual (ITS) del BCCDC antes de administrar Lentocilin S a una persona que está embarazada o amamantando.

Advertencia (Caution)

- **Interacciones medicamentosas:** tenga en cuenta que este documento no incluye las interacciones medicamentosas individuales. Hable con su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo.

Autocuidado después del tratamiento (Care of Yourself After Treatment)

- Se le pedirá que espere en la clínica 15 minutos después de sus inyecciones de Lentocilin S.
- Si tiene alguna reacción después del tratamiento (p. ej., sarpullido, comezón o dificultad para respirar), infórmeselo de inmediato a un miembro del personal.
- Si estos síntomas ocurren después de abandonar la clínica, busque inmediatamente ayuda médica urgente (llame al 9-1-1 o vaya al hospital o a un centro de atención urgente).

Efectos secundarios (Side Effects)

- Podría presentar dolor leve y pasajero en el lugar de la inyección.
- Podría presentar diarrea después del tratamiento.
- Algunas personas podrían presentar una **reacción de Jarisch-Herxheimer**: fiebre, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza o fatiga.
 - La reacción de Jarisch-Herxheimer es un conjunto de efectos secundarios pasajeros que pueden producirse unas cuantas horas después del tratamiento de la sífilis. No todos presentan esta reacción.
 - No se alarme; esta **no es una reacción alérgica** y normalmente termina en 24 horas.
 - Tome acetaminofén (Tylenol®) o ibuprofeno (Advil®) en caso de ser necesario para ayudar a aliviar los síntomas.
- Si estos efectos persisten o empeoran, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Etapas de la sífilis (Stages of Syphilis)

- Las recomendaciones de tratamiento y seguimiento se basan en cuánto tiempo ha estado presente en su cuerpo la infección de la sífilis. Su proveedor de atención médica le informará en qué etapa de la sífilis se encuentra y qué tratamiento es necesario. También podría recibir una llamada de una enfermera de parte del departamento de Salud Pública para hablar sobre el seguimiento a su pareja y sobre recomendaciones para pruebas de seguimiento.

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite www.smartsexresource.com o comuníquese con su proveedor de atención médica.

Información de SmartSex Resource: sífilis

