

DOXYCYCLINE

Doxycycline là một loại thuốc trụ sinh (kháng sinh) uống để điều trị một số bệnh nào đó truyền nhiễm qua đường tình dục (STIs).

Dị Ứng (Allergies)

- Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị bị dị ứng với bất cứ loại thuốc trụ sinh tetracycline nào như tetracycline hoặc minocycline

Thai Nghén và Cho Con Bú/Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ (Pregnancy and Breast/Chest Feeding)

- Doxycycline **không** an toàn để dùng trong thời kỳ thai nghén.
- Nên tránh dùng Doxycycline trong thời gian cho con bú/nuôi con bằng sữa mẹ vì trẻ sơ sinh có thể bị các ảnh hưởng không rõ. Hãy hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

KHUYẾN CÁO (CAUTION)

- Doxycycline có thể làm cho da của quý vị nhạy cảm hơn với ánh sáng và quý vị có thể bị cháy nắng và/hoặc cảm thấy lẩn tẩn như kim châm, tê hoặc bất thường ở những chỗ hở da. Tránh tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng hoặc tia UV nhân tạo (đèn đốt rám da hoặc giường phơi rám da). Hãy dùng kem chống nắng và mặc quần áo bảo vệ nếu quý vị sẽ ra nắng.
- Tránh dùng các sản phẩm có chứa chất vôi, nhôm, magnesium (thường thấy trong các loại thuốc bổ và antacids) hoặc bismuth subsalicylates (Pepto Bismol®) cùng lúc với doxycycline. Hãy dùng doxycycline 2 giờ trước hoặc 6 giờ sau khi dùng các sản phẩm này
- **Doxycycline có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của chứng nhược cơ.** Nếu quý vị bị nhược cơ (chứng rối loạn thần kinh cơ), xin hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe trước khi dùng doxycycline.
- Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị đã từng bị nhiễm men nấm.
- **Phản Ứng Giữa Các Loại Thuốc:** Xin lưu ý là tài liệu này không còn liệt kê từng trường hợp phản ứng giữa các loại thuốc. Nếu quý vị đang dùng bất cứ thuốc theo toa, thuốc không cần toa, thảo dược, hoặc các sản phẩm giải trí nào, xin hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Tác Dụng Phụ (Side Effects)

- Quý vị có thể bị tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng bất ngờ và nặng, ói mửa, nhức đầu, nổi đỏ da, nhạy sáng (tăng mức nhạy cảm với ánh nắng).

Hướng Dẫn Dùng Thuốc (Instructions for Taking)

- Dùng thuốc chung với thức ăn để tránh khó chịu dạ dày.
- Đừng nghiền nát, nhai, hoặc mở viên thuốc con nhộng.
- Nuốt trọn viên thuốc với một ly nước đầy, và đứng/ngồi thẳng lưng trong ít nhất 30 phút sau đó.
- Nếu quý vị quên một liều, hãy uống ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần đến giờ dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đó và tiếp tục dùng thuốc theo giờ thường lệ của quý vị. Đừng dùng liều gấp đôi.

Hướng Dẫn Lưu Trữ (Storage Instructions)

- cất thuốc ở nhiệt độ trong phòng từ 15 đến 30°C.
- Bảo vệ tránh ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm.
- Không dùng thuốc quá ngày hết hạn ghi trên nhãn.
- Cất xa tầm với của trẻ em.

Hướng Dẫn Đặc Biệt (Special Instructions)

- Đừng làm tình cho đến:
 - Một tuần sau khi quý vị đã bắt đầu điều trị, hoặc theo khuyến cáo của chuyên viên chăm sóc sức khỏe, VÀ
 - Một tuần sau khi (các) bạn tình đã bắt đầu điều trị, ngay cả khi kết quả thử nghiệm của họ là âm tính.
- Quý vị sẽ cần phải điều trị lại nếu quý vị làm tình với một bạn tình chưa được điều trị, hoặc nếu quý vị làm tình trước khi quý vị hoặc bạn tình của mình điều trị xong. Xin thảo luận với chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào hay cần thêm chi tiết, xin đến www.smartsexresource.com hoặc liên lạc với chuyên viên chăm sóc sức khỏe.