

# Pénicilline G benzathine (Bicillin<sup>MD</sup> L-A)

pour le traitement de la syphilis

## Penicillin G Benzathine (Bicillin<sup>®</sup> L-A)

For Treatment of Syphilis

**La pénicilline G benzathine (Bicillin<sup>MD</sup> L-A) à action prolongée** est le traitement par antibiotique privilégié pour la syphilis. Chaque dose nécessite deux injections intramusculaires, une injection dans chaque muscle de la hanche (lieu préféré) ou du fessier lors de la même visite.

**Une dose de 2,4 millions d'unités de Bicillin<sup>MD</sup> L-A** est habituellement suffisante pour traiter la syphilis infectieuse. Toutefois, si l'infection est présente depuis plus d'un an, ou si sa durée est inconnue, il faudra administrer trois injections de 2,4 millions d'unités de Bicillin<sup>MD</sup> L-A; ces injections sont administrées une fois par semaine pendant trois semaines.

### Allergies (Allergies)

- Si vous êtes allergique aux pénicillines ou aux céphalosporines, informez votre fournisseur de soins de santé :
  - par exemple, la pénicilline V-K et l'amoxicilline (Amoxil<sup>MD</sup>)
  - par exemple, la céfixime (Suprax<sup>MD</sup>), la céphalexine (Keflex<sup>MD</sup>) et le céfaclor (Ceclor<sup>MD</sup>)

### Grossesse et allaitement (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé si vous allaitez.
- Il est très important que vous suiviez un traitement à la suite d'un diagnostic de syphilis lors d'une grossesse ou pendant la période d'allaitement.
- Si l'on vous traite contre la syphilis au cours de la grossesse, consultez votre fournisseur de soins de santé pour des recommandations ou la prise en considération d'instructions particulières.

### Mise en garde (Caution)

- **Interactions médicamenteuses :** Veuillez noter que les interactions médicamenteuses spécifiques ne sont désormais plus mentionnées dans ce document. Si vous prenez des produits sur ordonnance, en vente libre, à base de plantes ou récréatifs, veuillez en discuter avec votre fournisseur de soins de santé.

### Soins après le traitement (Care of Yourself After Treatment)

- On vous demandera d'attendre pendant 15 minutes dans la clinique après les injections de Bicillin<sup>MD</sup> L-A.

- Si vous éprouvez une quelconque réaction après le traitement (p. ex. éruptions cutanées, démangeaisons, difficultés respiratoires), informez un membre du personnel immédiatement.
- Si ces symptômes surviennent après avoir quitté la clinique, ayez recours aux soins d'urgence immédiatement (appelez le 9-1-1 ou allez à l'hôpital ou à un centre des soins d'urgence).

## Effets secondaires (Side Effects)

- Vous pourriez avoir une légère douleur passagère au niveau du site d'injection.
- Vous pourriez avoir de la diarrhée après le traitement.
- Certains peuvent avoir une **réaction de Jarisch-Herxheimer** : fièvre, frissons, douleurs musculaires, maux de tête ou fatigue.
  - La réaction de Jarisch-Herxheimer se manifeste par la présence d'effets secondaires temporaires, pouvant se produire dans les quelques heures qui suivent un traitement de la syphilis. Ce n'est pas tout le monde qui aura cette réaction.
  - Ne vous inquiétez pas, **il ne s'agit pas d'une réaction allergique** et elle disparaît généralement dans les 24 heures.
  - Prenez de l'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>) ou de l'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>), au besoin, pour aider à soulager les symptômes.
- Si l'un de ces effets persiste ou s'aggrave, veuillez contacter votre fournisseur de soins de santé.

## Étapes de la syphilis (Stages of Syphilis)

- Le traitement et les recommandations de suivi sont basés sur la durée de la présence de l'infection causée par la syphilis dans votre corps. Votre fournisseur de soins de santé vous informera au sujet de l'étape de votre syphilis et vous prescrira le traitement adapté. Vous pouvez également recevoir un appel du personnel infirmier au nom de la santé publique pour discuter du suivi du partenaire et des recommandations pour les tests de suivi.

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, consultez [www.smartsexresource.com](http://www.smartsexresource.com) ou contactez votre fournisseur de soins de santé.

SmartSex Resource : Syphilis



Health Info du BCCDC : Syphilis

