

## Penicilina G benzatínica (Bicillin® L-A)

para el tratamiento de la sífilis

## Penicillin G Benzathine (Bicillin® L-A)

For Treatment of Syphilis

La **penicilina G benzatínica de acción prolongada (Bicillin® L-A)** es el antibiótico preferido para el tratamiento de la sífilis. Cada dosis requiere de dos inyecciones intramusculares, una en cada cadera (sitio preferido) o músculo del glúteo, durante la misma visita.

**Una dosis de 2.4 millones de unidades de Bicillin® L-A** es por lo general adecuada para tratar la sífilis infecciosa. Sin embargo, si la infección ha estado presente por más de un año, o si se desconoce la duración, entonces se necesitan tres dosis de Bicillin® L-A de 2.4 millones de unidades; estas inyecciones se administran una vez a la semana en un periodo de tres semanas.

### Alergias (Allergies)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alergias a las penicilinas o a las cefalosporinas:
  - por ejemplo, penicilina V-K y amoxicilina (Amoxil®)
  - por ejemplo, cefixima (Suprax®), cefalexina (Keflex®), cefaclor (Ceclor®)

### Embarazo y lactancia (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- Consulte a su proveedor de atención médica si está amamantando.
- Si se le diagnostica sífilis mientras está embarazada o amamantando, es muy importante que reciba tratamiento.
- Si está recibiendo tratamiento para la sífilis durante su embarazo, hable con su proveedor de atención médica sobre recomendaciones o consideraciones especiales.

### Advertencia (Caution)

- **Interacciones medicamentosas:** tenga en cuenta que este documento ya no incluye las interacciones medicamentosas individuales. Hable con su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo.

### Autocuidado después del tratamiento (Care of Yourself After Treatment)

- Se le pedirá que espere en la clínica 15 minutos después de sus inyecciones de Bicillin™ L-A.

- Si tiene alguna reacción después del tratamiento (p. ej., sarpullido, comezón, dificultad para respirar), infórmeselo de inmediato a un miembro del personal.
- Si estos síntomas ocurren después de abandonar la clínica, busque ayuda médica urgente de inmediato (llame al 9-1-1 o vaya al hospital o a un centro de atención urgente).

## Efectos secundarios (Side Effects)

- Podría presentar dolor leve y pasajero en el lugar de la inyección.
- Podría presentar diarrea después del tratamiento.
- Algunas personas podrían presentar una **reacción de Jarisch-Herxheimer**: fiebre, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza o fatiga.
  - La reacción de Jarisch-Herxheimer es un conjunto de efectos secundarios pasajeros que pueden producirse unas cuantas horas después del tratamiento de la sífilis. No todos presentan esta reacción.
  - No se alarme; esta **no es una reacción alérgica** y normalmente termina en 24 horas.
  - Tome acetaminofén (Tylenol®) o ibuprofeno(Advil®) en caso de ser necesario para ayudar a aliviar los síntomas.
- Si estos efectos persisten o empeoran, comuníquese con su proveedor de atención médica.

## Etapas de la sífilis (Stages of Syphilis)

- Las recomendaciones de tratamiento y seguimiento se basan en cuánto tiempo ha estado presente en su organismo la infección de la sífilis. Su proveedor de atención médica le informará qué etapa de sífilis tiene y qué tratamiento es necesario. También podría recibir una llamada de una enfermera de parte del departamento de Salud Pública para hablar sobre el seguimiento a su pareja y sobre recomendaciones para pruebas de seguimiento.

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite [www.smartsexresource.com](http://www.smartsexresource.com) o comuníquese con su proveedor de atención médica.

Recurso de SmartSex: sífilis



Información médica de BCCDC: sífilis

